

info

fauna•vs

Société valaisanne de biologie de la faune
Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie

N° 49 juillet 2026
Nr. 49 Juli 2026

Jubilé de fauna•vs info:
Le 21 novembre 2026 nour fêtons le n° 50 de notre bulletin. Les membres recevront une invitation personnelle.

Jubiläum des fauna•vs info:
Am 21. November 2026 feiern wir die 50. Bulletin-Ausgabe. Die Mitglieder erhalben eine persönliche Einladung.

L'inventaire des reptiles du Valais

Les serpents du Valais

Étrange fin pour un lynx et mise en scène macabre

Gypaète barbu: bilan de la saison de nidification 2025

Les moments forts du Réseau Chauves-souris en 2025

Le lynx en Valais: la régulation officielle supplantera-t-elle la longue tradition de régulation illégale?

fauna•vs dans la Vallée des Loups

Abattage d'un loup le 3 mai à Visperterminen: fauna•vs s'insurge

Das Reptilieninventar des Wallis

Die Schlangenarten des Wallis

Rätselhaftes Ende eines Luchses und Hinweise auf makabre Inszenierung

Bartgeier: Bilanz der Brutsaison 2025

Die Höhepunkte des Fledermaus-Netzwerks im Jahr 2025

Luchs im Wallis: Wird die offizielle Regulierung die lange Tradition der illegalen Verfolgung ablösen?

fauna•vs im Tal der Wölfe

Abschuss eines Wolfes am 3. Mai in Visperterminen: fauna•vs protestiert

L'inventaire des reptiles du Valais

faunaevs reçoit régulièrement des demandes concernant des observations de serpents. Des amoureux de la nature nous envoient des photos en nous demandant de quelle espèce il s'agit. Les serpents les plus souvent photographiés sont la vipère aspic et la coronelle lisse. Or, même entre ces deux espèces, il arrive parfois qu'on les confonde. Il est grand temps de consacrer un dossier spécial aux serpents dans notre bulletin.

Le Valais est l'une des régions de Suisse présentant la plus grande richesse spécifique de reptiles, abritant 13 des 16 taxons indigènes présents sur le territoire national. Cette diversité exceptionnelle s'explique par la grande variété de milieux naturels qu'offre le canton, des coteaux secs et ensoleillés des fonds de vallées aux pelouses alpines au-dessus de la limite de la forêt.

Conscient de cette richesse biologique, l'État du Valais, par l'intermédiaire de son Service des forêts, de la nature et du paysage (SFNP; anciennement Service des forêts et du paysage), avait mandaté dès 1995 l'herpétologue valaisan Jean-Marc Pillet afin de réaliser un inventaire cantonal des reptiles. Les travaux de terrain ont été menés principalement entre 1996 et 1997, mais l'étude s'est également appuyée sur plusieurs décennies d'observations accumulées par le spécialiste depuis le début de sa carrière, en 1966-67. Cet important travail a permis d'établir, en 1998, une première vision globale de la répartition des reptiles à l'échelle du canton (rapport non publié). Une grande partie des données de Jean-Marc Pillet figuraient au format papier au moment de son décès en 2010, limitant leur valorisation scientifique et leur utilisation dans le domaine de la biologie de la conservation (Fig. 1).




Fig. 1: *Carte de répartition du lézard des murailles en Valais réalisée par Jean-Marc Pillet (1998). Les points figurant la présence de l'espèce dans chaque kilomètre carré ont été indiqués à la main, mais chacun ne correspond pas forcément à une observation réelle (extrapolation probable).*

Abb. 1: *Verbreitungskarte der Mauereidechse im Wallis, erstellt von Jean-Marc Pillet (1998). Die Punkte, die das Vorkommen der Art in jedem Quadratkilometer anzeigen, wurden von Hand eingezeichnet und entsprechen nicht unbedingt immer einer tatsächlichen Beobachtung (wahrscheinliche Hochrechnung).*

Das Reptilieninventar des Wallis

fauna•vs erhält regelmässig Anfragen zu Schlangenbeobachtungen. Immer wieder schicken uns interessierte Naturliebhaber:innen Fotos mit der Frage, um welche Schlange es sich handelt. Am häufigsten werden die Aspisviper und die Schlingnatter fotografiert. Und schon bei diesen beiden Arten gibt es manchmal Verwechslungen. Höchste Zeit, den Schlangen in unserem Bulletin einen Schwerpunkt zu widmen.

Das Wallis zählt zu den reptilienreichsten Regionen der Schweiz und beherbergt 13 der 16 Schweizer Reptilienarten. Diese aussergewöhnliche Vielfalt ist auf die grosse Vielfalt an natürlichen Lebensräumen in unserem Kanton zurückzuführen – von den trockenen und sonnigen Hängen der Talebene bis hin zu alpinen Wiesenflächen oberhalb der Waldgrenze.

Im Bewusstsein dieses biologischen Reichtums beauftragte der Kanton Wallis bereits 1995 via die Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft (DWNL; früher Dienststelle für Wald und Landschaft) den Walliser Herpetologen Jean-Marc Pillet mit der Erstellung eines kantonalen Reptilieninventars. Die Feldarbeiten wurden hauptsächlich in den Jahren 1996 und 1997 durchgeführt. Die Studie stützte sich jedoch auch auf mehrere Jahrzehnte von Beobachtungen, die der Spezialist seit Beginn seiner beruflichen Tätigkeit in den Jahren 1966/67 gesammelt hatte. Diese umfangreiche Arbeit ermöglichte es, 1998 erstmals einen kantonsweiten Überblick über die Verbreitung der Reptilien zu erstellen (unveröffentlichter Bericht). Zum Zeitpunkt des Todes von Jean-Marc Pillet im Jahr 2010 lag ein grosser Teil seiner Daten jedoch nur in Papierform vor, was die wissenschaftliche Auswertung und den Nutzen für die Naturschutzbiologie limitierte.

Zwischen 1999 und 2001 grenzte Jean-Marc Pillet in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) zudem 19 Reptilienbiotope von nationaler Bedeutung auf Walliser Kantonsgebiet ab. Diese Objekte, die sich zwischen Dorénaz und Leuk befinden, umfassen unter anderem die Follatères und den Pfynwald, die als eigentliche Hotspots der herpetologischen Vielfalt in der Schweiz gelten. Obwohl diese Biotope einen hohen ökologischen Wert aufweisen, ist ihr Inventar nicht offiziell genehmigt und verfügt daher derzeit über keine verbindliche rechtliche Grundlage. Zudem erscheinen einige der damals festgelegten Perimeter heute zu gross oder nur noch bedingt an die aktuellen Gegebenheiten im Gelände angepasst.

Im Anschluss an ein im Jahr 2014 im Walliser Grossen Rat eingereichtes Postulat wurde die DWNL vom Staatsrat beauftragt, die Entwicklung der Schlangenbestände sowie das mögliche Vorkommen nicht einheimischer Arten zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, ein neues Reptilieninventar zu erstellen, um die geografische Verbreitung der Arten genauer zu erfassen und die Entwicklung ihrer Populationen zu beurteilen. Von besonderem Interesse waren dabei die Schlangen.



© Brigitte Wolf

La coronelle lisse est souvent confondue avec la vipère aspic.
Die Schlingnatter wird oft mit der Aspisviper verwechselt.

Dieses neue kantonale Reptilieninventar wurde ab 2015 in Zusammenarbeit mit der karch aufgebaut. Die DWNL beauftragte das Büro drosera écologie appliquée SA zunächst mit der Aufarbeitung der von Jean-Marc Pillet erhobenen Daten. Dazu gehörten die Digitalisierung der Verbreitungskarten sowie die Erfassung von Daten aus Feld-notizen und Erhebungsblättern. In einer zweiten Projektphase wurde die Methodik für die Feldkampagnen entwickelt. Die Erhebungen, an denen verschiedene erfahrene Walliser Herpetolog:innen beteiligt waren, begannen 2017 unter der Koordination des Büros drosera. Das Projekt umfasste drei grosse Bereiche:

1) Monitoring der Populationen (Bestandsentwicklung)

Der erste Projektteil umfasste ein standardisiertes Monitoring von rund einem Dutzend Standorten mit Reptilienvorkommen, insbesondere jener Arten, die für den Kanton Wallis prioritär sind: Smaragdeidechse, Äskulapnatter, Aspisviper und Vipernatter. Ein bedeutender Teil des Schweizer Verbreitungsgebietes dieser vier Arten liegt im Wallis, weshalb dem Kanton für deren Erhaltung eine besondere Verantwortung zukommt. Das Monitoring basiert auf harmonisierten Erhebungsmethoden und umfasst während fünf Jahren mehrere jährliche Begehungen entlang von festgelegten Transekten. Dabei wurden sowohl Sichtbeobachtungen berücksichtigt als auch künstliche Reptilienverstecke eingesetzt. Die zwischen 2017 und 2021 durchgeführten Erhebungen führten zu etwas mehr als 2500 Beobachtungen. Sie ermöglichten den Nachweis der verschiedenen Arten und lieferten erste Hinweise zum Zustand ihrer Populationen. Eine weitere Erhebungskampagne würde



© Brigitte Wolf

Une vipère aspic avec un dessin dorsal particulièrement bien marqué (Gletsch, 2026)
Eine Aspisviper mit einem besonders ausgeprägten Rückenmuster (Gletsch, 2026)

Entre 1999 et 2001, en collaboration avec le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch), Jean-Marc Pillet a également délimité 19 biotopes à reptiles d'importance nationale (BRIN) sur le territoire valaisan. Répartis entre Dorénaz et Loèche, ces objets comprennent notamment les Follatères et le bois de Finges, considérés comme de véritables hotspots de diversité herpétologique en Suisse. Bien que ces biotopes possèdent une grande valeur écologique, leur inventaire n'est pas homologué et ne repose ainsi actuellement sur aucune base juridique contraignante. Qui plus est, une partie des périmètres définis apparaissent aujourd'hui trop vastes ou peu adaptés aux réalités actuelles du terrain.

Suite à un postulat déposé au Grand Conseil valaisan en 2014, le SFNP a été mandaté par le Conseil d'Etat pour examiner l'évolution des effectifs de la population ophidienne (serpents) et la présence éventuelle d'espèces non indigènes. Il a été ainsi décidé d'établir un inventaire des reptiles dans l'objectif de préciser leur répartition géographique et d'évaluer l'évolution des effectifs des populations, en particulier celles des serpents.

Ce nouvel inventaire cantonal des reptiles est ainsi initié dès 2015, en coordination avec le karch. Le bureau drosera écologie appliquée SA a été mandaté par le SFNP avec comme première étape la valorisation des données récoltées par Jean-Marc Pillet (digitalisation des cartes de répartition et saisies des données à partir des notes et fiches de terrain). La seconde étape du projet a consisté à élaborer la méthodologie qui sera appliquée sur le terrain pour les campagnes de relevés. Ces derniers, mobilisant différents herpétologues valaisans expérimentés, ont débuté en 2017, sous la coordination du bureau d'études. Le projet s'est articulé autour de trois grands volets:

1) Monitoring des populations (évolution des effectifs)

Le premier volet a consisté en un suivi standardisé d'une douzaine de sites abritant des populations de reptiles, en particulier les espèces prioritaires pour le canton du Valais: le lézard vert, la couleuvre d'Esculape, la vipère aspic et la couleuvre mauresque. Le canton du Valais a, en effet, une responsabilité élevée pour la préservation de ces quatre espèces, car une grande part de leur répartition suisse se trouve dans le canton. Ce monitoring repose sur des méthodes de prospection harmonisées et comprend plusieurs visites annuelles pendant cinq ans, le long de transects prédéfinis, par le biais de recherches visuelles et à l'aide d'abris artificiels à reptiles. Ces relevés, réalisés entre 2017 et 2021, ont permis de récolter un peu plus de 2500 observations, de détecter la présence des espèces et de donner une première idée de l'état de leurs populations. Une prochaine campagne de prospection devrait permettre d'estimer plus précisément l'évolution démographique de ces dernières (augmentation, diminution, voire disparition locale de certaines d'entre elles).

2) Actualisation de l'inventaire des espèces (zones de présence et répartition géographique)

Le deuxième volet du projet, toujours en cours, vise à compléter les lacunes des connaissances sur la distribution des reptiles en Valais, soit de confirmer des données anciennes (aucune confirmation depuis l'année 2000) et/ou d'actualiser l'inventaire de Jean-Marc Pillet de 1998 (mentions sans observations saisies dans la base de données d'infofauna/karch). En cinq ans (2017-2021), 80 carrés kilométriques ont été prospectés. Depuis l'année 2022, la poursuite de ce travail d'inventaire repose sur l'engagement de bénévoles. De 2022 à 2025, de précieuses données ont été récoltées dans une cinquantaine de carrés kilométriques supplémentaires. Une carte interactive en ligne permet aux intéressés d'identifier les secteurs prioritaires à prospecter, de réserver un carré d'inventaire et de télécharger les cartes nécessaires aux relevés de terrain (Fig. 2). Les prospections ciblent principalement les carrés kilométriques où les espèces prioritaires sont historiquement mentionnées, mais pour lesquelles aucune observation n'a été relevée dans la base de données nationale d'infofauna/karch depuis au moins l'année 2000.

Toute personne intéressée et motivée à prendre part à ce projet, même sans expérience approfondie, peut s'annoncer auprès de florian.dessimoz@drosera-vs.ch et recevra les informations utiles pour réaliser les relevés de terrain.




Fig. 2: *Carte interactive en ligne présentant les carrés de 1 km² et 5x5 km à prospecter en priorité. En rouge les carrés de 1 km² nécessitant des confirmations d'espèces prioritaires sur la base des mentions de Jean-Marc Pillet, en bleu des carrés de 5x5 km avec des données sans confirmations depuis 2000 (état: 2026).*

Abb. 2: *Interaktive Online-Karte der prioritär zu bearbeitenden 1x1- und 5×5-km-Quadrate. Rot dargestellt sind 1x1-km-Quadrate mit historischem Vorkommen prioritärer Arten nach Jean-Marc Pillet, die einer Bestätigung bedürfen; blau markiert sind 5×5-km-Quadrate mit Nachweisen, die seit 2000 nicht mehr bestätigt wurden (Stand 2026).*

es erlauben, die demografische Entwicklung dieser Bestände genauer zu beurteilen und mögliche Zu- oder Abnahmen beziehungsweise lokale Bestandsverluste zu erkennen.

2) Aktualisierung des Arteninventars (Orte mit Vorkommen und geografische Verbreitung)

Der zweite Projektteil, der weiterhin läuft, verfolgt das Ziel, Wissenslücken zur Verbreitung der Reptilien im Wallis zu schliessen. Dabei sollen ältere Nachweise bestätigt werden, für die seit dem Jahr 2000 keine Bestätigung mehr vorliegt, und/oder das Inventar von Jean-Marc Pillet aus dem Jahr 1998 aktualisiert werden, insbesondere bei Meldungen, zu denen in der Datenbank von info fauna/karch keine Beobachtungen erfasst sind. In den fünf Jahren von 2017 bis 2021 wurden 80 Kilometerquadrate untersucht. Seit 2022 wird diese Inventarisierungsarbeit mit Unterstützung freiwilliger Mitarbeitender fortgeführt. Zwischen 2022 und 2025 konnten wertvolle Daten aus weiteren rund 50 Kilometerquadraten gesammelt werden.

Eine interaktive Online-Karte ermöglicht es Interessierten, prioritäre Untersuchungsgebiete zu identifizieren, ein Inventarquadrat zu reservieren und die für die Feldarbeit erforderlichen Karten herunterzuladen (Abbildung 2). Die Erhebungen konzentrieren sich hauptsächlich auf jene Kilometerquadrate, in denen prioritäre Arten historisch nachgewiesen wurden, für die jedoch seit mindestens dem Jahr 2000 keine Beobachtungen mehr in der nationalen Datenbank von info fauna/karch erfasst worden sind.

Interessierte, motivierte Personen sind eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Auch ohne umfassende Vorkenntnisse ist eine Mitarbeit möglich. Melden Sie sich bei florian.dessimoz@drosera-vs.ch, damit sie die nötigen Informationen zur Durchführung der Felderhebungen erhalten.

3) Beurteilung der Reptilienbiotope von nationaler Bedeutung.

Der dritte Projektteil schliesslich war der Bewertung, Überwachung und Erhaltung der Reptilienbiotope von nationaler Bedeutung gewidmet. Ziel war es, ein regelmässiges Monitoring dieser Objekte sicherzustellen, Kerngebiete zu identifizieren sowie die erforderlichen Schutz- und Pflegemassnahmen festzulegen, um die Lebensräume aufzuwerten und die biologische Vernetzung zwischen den Populationen zu gewährleisten. Diese Aspekte sind in objektspezifischen Datenblättern zusammengefasst. Sie beschreiben den aktuellen Zustand der Lebensräume, bewerten bestehende Gefährdungen, identifizieren ökologische Verbindungen

3) Diagnostic des biotopes à reptiles d'importance nationale (BRIN).

Enfin, le troisième volet a été consacré à l'évaluation, au suivi et à la conservation des objets de l'inventaire des biotopes à reptiles d'importance nationale (BRIN). Les objectifs consistaient à assurer un monitoring régulier des objets, identifier les zones nodales et définir les mesures de protection et de gestion nécessaires pour améliorer les habitats et garantir la connectivité biologique entre les populations. Ces éléments sont synthétisés dans une fiche descriptive propre à chaque objet, qui décrit également l'état actuel des habitats, évalue les menaces, identifie les liaisons biologiques et précise les mesures qu'il serait utile de mettre en œuvre. Ces fiches sont destinées aux communes et aux gestionnaires régionaux/locaux. Des réflexions sont actuellement menées pour évaluer objectivement les critères définissant les objets d'importance nationale (voire cantonale, régionale ou locale), afin de mieux protéger les habitats favorables aux reptiles et de renforcer durablement la préservation de cette biodiversité remarquable à l'échelle cantonale.

Afin de poursuivre cet ambitieux projet de conservation, toute donnée saisie (webfauna.cscf.ch ou ornitho.ch) peut contribuer à améliorer les connaissances sur les reptiles valaisans et participer à la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel. ■

Florian Dessimoz, Barbara Molnar et Nicolas Dulex

Remerciements

Ce projet a été initié et est financé par le Service des forêts, de la nature et du paysage du canton du Valais, et réalisé en collaboration avec infofauna/karch. Une vingtaine de collaborateurs de terrain, indépendants ou employés de différents bureaux privés ainsi que de nombreux bénévoles ont participé aux relevés de terrain. Le bureau drosera écologie appliquée SA a développé la méthodologie et réalisé une partie des relevés de terrain.

Les personnes ayant participé à la collecte de données pour le projet sont les suivantes (par ordre alphabétique): François Allegro, Claudia Baumberger, François Biollaz, Dany Buffat, Marjorie Bonvin, Stève Breitenmoser, Yves Brunelli, Dany Buffat, Antoine Burri, Mathis Carreira, Ivana Cervenka, Basile Chabbey, Jan Charvat, Bernard Claude, François Claude, Yann Clavien, Max Dähler, Guillaume Descloux, Florian Dessimoz, Emilie Dessimoz, Nicolas Dulex, Didier Frossard, David Guerra, Severin Erni, Noémie Evéquoz, Jérôme Fournier, Manuel Freiburghaus, Ralph Imstepf, Colin Jaunin, Quentin Kohler, Samuel Lamon, Christian Monnerat, Andreas Meyer, Eric Morard, Florence Noirat, Patrick Patthey, Viviane Perraudin, Olivier Putallaz, Elodie Rey, Heinz Rindlisbacher, Julien Rombaldoni, Aurel Salamin, Andreas Schild, Frédéric Schlatter, Silvan Stöckli, Maiann Suhner, Sylvain Ursenbacher, Remo Wenger, Annie White, Julia Wildi, Flavio et Matteo Zanini.

Nous remercions sincèrement tous les collaborateurs de terrain impliqués dans le projet, ainsi que l'équipe d'infofauna / karch (Sylvain Ursenbacher, Fanny Kupferschmid et Thierry Bohnenstengel). Merci également à Viviane Perraudin pour l'aide à la rédaction de cet article.

Les serpents du Valais

Le canton du Valais compte sept serpents indigènes sur les neuf présents en Suisse. Quatre espèces sont présentes sur une majorité du territoire cantonal (coronelle lisse, couleuvre d'Esculape, couleuvre à collier helvétique et vipère aspic) et trois espèces sont des particularités régionales ou locales (couleuvre verte et jaune, couleuvre mauresque et vipère péliade). Seules les deux espèces de vipères sont venimeuses (vipère aspic et vipère péliade, venin cytotoxique).


Une espèce de serpent supplémentaire est allochtone, la couleuvre tesselée (1ère observation à St-Gingolph en 2024) et une autre, la couleuvre verte et jaune, est en même temps indigène (à Gondo) et allochtone (introduite vers 1950 à Bex d'où elle a colonisé le Chablais).

Les couleuvres sont ovipares (à l'exception de la coronelle lisse qui est ovovivipare) et les vipères sont ovovivipares.

Les huit espèces du Valais sont décrites brièvement dans le tableau à la page suivante. ■

Florian Dessimoz, biologiste (textes, photos et cartes), drosera écologie appliquée SA, contact: florian.dessimoz@drosera-vs.ch

Légende des cartes (pages suivantes):



Répartition en Valais dans un maillage 5 x 5 km (et 10 x 10 km pour les vipères) selon le code de déontologie d'infofauna/karch. Uniquement données valaisannes (infofauna/karch et Jean-Marc Pillet).

Pour plus d'informations sur les espèces (notice par espèce): centres de coordination nationaux - Reptiles (KARCH) **www.infofauna.ch**

Pour saisir vos observations: **https://webfauna.cscf.ch/** (à accompagner de photos si possible).



© Brigitte Wolf

Le lézard vert: une espèce prioritaire pour le canton du Valais
Die Smaragdeidechse: eine prioritäre Art für das Wallis

und präzisieren Massnahmen, deren Umsetzung sinnvoll erscheint. Die Datenblätter richten sich an die Gemeinden sowie an regionale und lokale Bewirtschafter:innen.

Derzeit werden Überlegungen angestellt, um objektive Kriterien zur Einstufung von Objekten von nationaler Bedeutung – gegebenenfalls auch von kantonaler, regionaler oder lokaler Bedeutung – aufzustellen. Ziel ist es, die für Reptilien geeigneten Lebensräume besser zu schützen und den Erhalt dieser bemerkenswerten Biodiversität auf kantonaler Ebene langfristig zu stärken.

Um das ambitionierte Naturschutzprojekt weiterzuführen, trägt jede gemeldete Beobachtung (auf webfauna.cscf.ch oder ornitho.ch) dazu bei, das Wissen über die Reptilienfauna des Wallis zu erweitern und zum Erhalt dieser aussergewöhnlichen Tiergruppe beizutragen. ■

Florian Dessimoz et Barbara Molnar

Dank

Das Projekt wurde von der Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft Wallis initiiert und finanziert sowie in Zusammenarbeit mit info fauna/karch durchgeführt. Rund 20 Feldmitarbeitende – selbstständig tätig oder bei privaten Büros angestellt – sowie zahlreiche Freiwillige beteiligten sich an den Geländeerhebungen. Das Büro drosera écologie appliquée SA entwickelte die Methodik und führte einen Teil der Felderhebungen durch.

An der Datenerhebung beteiligt waren (in alphabetischer Reihenfolge) folgende Personen: François Allegro, Claudia Baumberger, François Biollaz, Dany Buffat, Marjorie Bonvin, Stève Breitenmoser, Yves Brunelli, Dany Buffat, Antoine Burri, Mathis Carreira, Ivana Cervenka, Basile Chabbey, Jan Charvat, Bernard Claude, François Claude, Yann Clavien, Max Dähler, Guillaume Descloux, Florian Dessimoz, Emilie Dessimoz, Nicolas Dulex, Didier Frossard, David Guerra, Severin Erni, Noémie Evéquoz, Jérôme Fournier, Manuel Freiburghaus, Ralph Imstepf, Colin Jaunin, Quentin Kohler, Samuel Lamon, Christian Monnerat, Andreas Meyer, Eric Morard, Florence Noirat, Patrick Patthey, Viviane Perraudin, Olivier Putallaz, Elodie Rey, Heinz Rindlisbacher, Julien Rombaldoni, Aurel Salamin, Andreas Schild, Frédéric Schlatter, Silvan Stöckli, Maiann Suhner, Sylvain Ursenbacher, Remo Wenger, Annie White, Julia Wildi sowie Flavio und Matteo Zanini.

Wir danken allen Feldmitarbeitenden herzlich für ihr Engagement. Unser Dank gilt ebenso dem Team von info fauna / karch (Sylvain Ursenbacher, Fanny Kupferschmid und Thierry Bohnenstengel). Ein besonderer Dank geht zudem an Viviane Perraudin für ihre Unterstützung bei der Redaktion dieses Artikels.

Die Schlangenarten des Wallis

Im Wallis kommen sieben der insgesamt neun in der Schweiz heimischen Schlangenarten vor. Vier Arten sind in weiten Teilen des Kantons verbreitet (Schlingnatter, Äskulapnatter, Ringelnatter und Aspisviper), während drei Arten regionale oder lokale Besonderheiten darstellen (Gelbgrüne Zornnatter, Vipernatter und Kreuzotter). Von allen Arten sind lediglich die beiden Vipernarten – Aspisviper und Kreuzotter – giftig, wobei das Gift vorwiegend zytotoxisch wirkt

Eine weitere Schlangenart, die Würfelnatter, gilt im Wallis als allochthon (erster Nachweis 2024 in St-Gingolph). Die Gelbgrüne Zornnatter ist in Gondo autochthon, im Chablais jedoch allochthon, wo sie sich von einer um 1950 bei Bex freigelassenen Population aus verbreitet hat.

Die Natternarten sind eierlegend (ovipar), mit Ausnahme der Schlingnatter, die wie die beiden Vipernarten lebendgebärend beziehungsweise ovovivipar (eilebendgebärend) ist.

Die acht Arten des Wallis werden in der Tabelle auf den nächsten beiden Seiten vorgestellt. ■

Florian Dessimoz, Biologe bei drosera écologie appliquée SA (Texte, Fotos, Karten), florian.dessimoz@drosera-vs.ch

Legende der Karten (nächste Seiten):

- Daten nach 2000
- Daten vor 2000
- Nachweise von J.-M. Pil
- Gebietsfremd

Verbreitung der Arten im Wallis nach einem 5×5-km-Raster (10×10 km bei den Vipern) gemäss dem Verhaltenskodex von info fauna/karch. Dargestellt sind ausschliesslich Walliser Daten aus info fauna/karch sowie den Erhebungen von Jean-Marc Pillet.

Weitere Informationen zu den Arten (Artporträts):
Nationale Koordinationsstelle – Reptilien (karch)
www.infofauna.ch

Erfassung Ihrer Beobachtungen: **https://webfauna.cscf.ch/** (bitte wenn möglich mit Fotos).

Serpents inoffensifs – pupilles rondes – corps élancé – écailles lisses – couleuvres non aquatiques
Ungiftige Schlangen – runde Pupillen – schlanker Körper – glatte Schuppen – nicht aquatische Nattern

Coronelle lisse *Coronelle austriaca* – en danger

Max 70 cm. Serpent le plus fréquent de CH (jusqu'à 2000 m d'alt.), très discret. Souvent confondu avec la vipère, il se nourrit principalement de reptiles (lézards, jeunes vipères). Ovovivipare.

Schlingnatter *Coronella austriaca* – gefährdet

Max. 70 cm. Häufigste Schlangenart der Schweiz (bis in Höhenlagen von 2000 m ü. M.), jedoch sehr versteckt lebend. Wird häufig mit der Aspisviper verwechselt. Ernährt sich hauptsächlich von Reptilien (Eidechsen, junge Vipern). Ovovivipar.






Couleuvre d'Esculape *Zamenis longissimus* – en danger, prioritaire VS

Plus de 120 cm ♀ / 150 cm ♂. Serpent arboricole figurant sur l'enseigne des pharmacies. Régulateur par excellence des populations de rongeurs. Jusqu'à Gampel (et Gondo) et 1600 m d'altitude. Aussi présente dans les cantons de GE, VD, TI, GR.

Äskulapnatter *Zamenis longissimus* – gefährdet, prioritär fürs Wallis

Über 120 cm ♀ / 150 cm ♂. Kletterfreudig, teilweise baumbewohnend, als Symboltier auf dem Apothekenzeichen dargestellt. Hervorragender Regulator von Nagetierpopulationen. Im Wallis bis nach Gampel (und Gondo) sowie bis auf 1600 m ü. M. Auch in den Kantonen GE, VD, TI und GR.






Couleuvre verte et jaune *Hierophis viridiflavus carbonarius* – en danger

Jusqu'à 200 cm, plus grand serpent de Suisse. Indigène au Sud Simplon ainsi que TI et GR (à Genève: *H. v. viridiflavus)*, introduit dans la vallée du Rhône (Chablais) d'où elle s'est propagée. Généraliste à régime alimentaire varié et exigences d'habitat peu élevé. Compétition directe avec les reptiles indigènes.

Gelbgrüne Zornnatter *Hierophis viridiflavus* carbonarius – gefährdet

Bis 200 cm, grösste Schlangenart der Schweiz. Simplonsüdseite sowie in den Kantonen TI und GR (in Genf kommt *H. v. viridiflavus* vor). Im Rhonetal (Chablais) wurde sie eingeführt und hat sich von dort ausgebreitet. Generalist mit breitem Nahrungsspektrum und geringen Habitatansprüchen. Steht in direkter Konkurrenz zu einheimischen Reptilienarten.





Serpents inoffensifs – pupilles rondes – corps élancé – écailles carénées – couleuvres aquatiques
Ungiftige Schlangen – runde Pupillen – schlanker Körper – gekielte Schuppen – aquatisch lebende Nattern

Couleuvre à collier helvétique *Natrix helvetica* – en danger

Max 140 cm ♀ / 100 cm ♂. Serpent lié aux milieux aquatiques pour la reproduction, mais très mobile. Fréquent en plaine, jusqu'à 1500 m d'altitude. Absent de Goms. Généraliste, surtout batraciens et poissons.

Ringelnatter *Natrix helvetica* – gefährdet

Max. 140 cm ♀ / 100 cm ♂. Für die Fortpflanzung an Gewässer gebunden, aber sehr mobil. Häufig in den Tallagen und bis auf 1500 m ü. M. Im Goms nicht nachgewiesen. Generalistin mit breitem Nahrungsspektrum; ernährt sich vor allem von Amphibien und Fischen.






Couleuvre mauresque / vipérine *Natrix maura* – au bord de l'extinction, prioritaire VS

Max 90 cm ♀ / 70 cm ♂. Serpent le plus rare de Suisse. Aquatique, essentiellement piscivore. Dernières populations en plaine à Fully et Saillon, déconnectées des pop. lémaniques et genevoises. Espèce méditerranéenne.

Vipernatter *Natrix maura*– vom Aussterben bedroht, prioritär fürs Wallis

Max. 90 cm ♀ / 70 cm ♂. Seltenste Schlangenart der Schweiz. Wasserlebend und hauptsächlich fischfressend (piscivor). Die letzten Walliser Populationen befinden sich in den Talebenen bei Fully und Saillon und sind von den Populationen am Genfersee sowie im Kanton Genf isoliert. Mediterrane Art.





Couleuvre tesselée *Natrix tessellata*, 1ère observation en VS en 2024

Max 130 cm ♀ / 70 cm ♂. Introduit autour du Léman (indigène au TI) par le déplacement de bâteaux (ballast). Grand serpent aquatique, piscivore. Compétition et confusions fréquentes avec la couleuvre mauresque *(Natrix maura)*.

Würfelnatter *Natrix tessellata*, 1. Nachweis im VS im Jahr 2024

Max. 130 cm ♀ / 70 cm ♂. Um den Genfersee mit Bootstransporten (Ballastwasser) eingeschleppt (im Tessin aber einheimisch). Grosse wasserlebende, fischfressende Schlange. Konkurrenz für die Vipernatter *(Natrix maura)* und häufige Verwechslung mit dieser Art.





Serpents venimeux – pupilles verticales – corps dodu – écailles carénées
Giftige Schlangen – senkrechte Pupillen – gedrungener Körper – gekielte Schuppen

Vipère aspic *Vipera aspis* – en danger, prioritaire VS

Rarement plus de 70 cm. Museau retroussé et petites écailles sur la tête. Largement répandue sur les coteaux et dans les alpes valaisannes jusqu'à plus de 2000 m d'alt. Carnivore (rongeurs et lézards). Ovovivipare.

Aspisviper *Vipera* aspis – gefährdet, prioritär fürs Wallis

Selten mehr als 70 cm. Aufgeworfene Schnauzenspitze und kleine Schuppen auf dem Kopf. Weit verbreitet an den Talhängen sowie in den Walliser Alpen bis über 2000 m ü. M. Fleischfressend (Nagetiere und Eidechsen). Ovovivipar.





Vipère péliade *Vipera berus* – en danger

Max 50-55 cm. Museau plat et grandes écailles sur la tête. En limite d'aire de répartition, très localisée, proche des Préalpes VD-BE. Moins compétitive que la Vipère aspic *(V. aspis)*. Carnivore. Ovovivipare.

Kreuzotter *Vipera berus* – gefährdet

Max. 50–55 cm. Flache Schnauze und grosse Schuppen auf dem Kopf. Am Rand ihres Verbreitungsgebiets, sehr lokal vorkommend, nahe den Waadtländer und Berner Voralpen. Weniger konkurrenzfähig als die Aspisviper *(Vipera aspis)*. Fleischfressend. Ovovivipar.





Pour plus d'informations sur les espèces (notice par espèce):
centres de coordination nationaux - Reptiles (karch)
www.infofauna.ch

Weitere Informationen zu den Arten (Artporträts) unter:
Nationale Koordinationsstelle – Reptilien (karch)
www.infofauna.ch

Étrange fin pour un lynx et mise en scène macabre

Le cadavre d'un lynx adulte a été retrouvé en octobre 2025 sur les hauts de Dorénaz. Si les circonstances de sa mort demeurent mystérieuses, tout indique que la carcasse a été déposée là avec un souci particulier de mise en scène. Raphaël Arlettaz décrypte le cas pour fauna•vs.

Le 20 octobre 2025, une personne découvrait la carcasse d'un lynx à Champex d'Alesse sur Dorénaz, au bord d'un sentier peu passant, mais surtout à quelques dizaines de mètres seulement de l'emplacement des pièges à collet jadis déployés par le tristement célèbre Lini Paccolat, aujourd'hui décédé, condamné en 2015 pour braconnage de lynx.

Le quidam en question m'en informait le 22 octobre, préférant s'adresser à moi plutôt qu'au personnel du Service de la chasse ou à la police cantonale, ceci en raison de pressions exercées antérieurement sur lui par ces instances à la suite de sa dénonciation d'agissements illicites à l'encontre du lynx dans le même secteur. Si j'ai été contacté, c'est parce que mon groupe à l'Université de Berne est connu pour effectuer des recherches sur les relations prédateurs-proies (carnivores-ongulés) depuis 2011 sur l'ensemble du territoire valaisan.

Malgré l'état avancé de décomposition de la carcasse, il nous a été possible d'identifier l'individu en question sur la base de son pelage (Fig. 1 et 2). Il avait été détecté 161 fois sur 11 sites différents (soit 11 pièges photos), au cours de quatre hivers consécutifs, depuis le 1er décembre 2021, ce qui permet a posteriori de reconstituer son domaine vital et ses déplacements (Fig. 3). Vu les localisations proches de la frontière vaudoise, il se pourrait que ce lynx ait également évolué dans le Chablais limitrophe. Nous avons interrogé le KORA dans ce sens, mais son responsable a refusé de nous répondre en l'état d'avancement du dossier.




***Fig. 1** (voir aussi page suivante): Le lynx retrouvé mort près de Dorénaz, photographié à différents moments de son existence.*
***Abb. 1** (siehe auch nächste Seite): Der bei Dorénaz tot gefundene Luchs, fotografiert zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben.*

Rätselhaftes Ende eines Luchses und Hinweise auf makabre Inszenierung

Im Oktober 2025 wurde oberhalb von Dorénaz der Kadaver eines adulten Luchses entdeckt. Die Todesursache ist bislang ungeklärt. Die Umstände des Fundes sprechen jedoch dafür, dass der Tierkörper gezielt an diesem Ort abgelegt und bewusst in Szene gesetzt wurde. Raphaël Arlettaz analysiert den Fall für fauna•vs.

Am 20. Oktober 2025 entdeckte eine Privatperson den Kadaver eines Luchses bei Champex d'Alesse oberhalb von Dorénaz am Rand eines wenig begangenen Wanderwegs, nur wenige Dutzend Meter von jener Stelle entfernt, an welcher der inzwischen verstorbene Lini Paccolat Drahtschlingen zum Fang von Luchsen ausgelegt hatte. Paccolat war 2015 wegen illegaler Luchsjagd rechtskräftig verurteilt worden.

Der Finder informierte mich am 22. Oktober über den toten Luchs. Er zog es vor, sich direkt an mich zu wenden, anstatt den Wildhüter oder die Kantonspolizei zu benachrichtigen. Hintergrund waren frühere Erfahrungen, die er gemacht hatte, nachdem er den Behörden im selben Gebiet wiederholt mutmasslich illegale Handlungen bezüglich Luchsen gemeldet hatte und sich danach unter Druck gesetzt fühlte. Der Kontakt zu meiner Arbeitsgruppe an der Universität Bern kam zustande, weil wir seit 2011 im gesamten Kanton Wallis die Beziehungen zwischen Grossraubtieren und ihren Beutetieren untersuchen.

Trotz des bereits weit fortgeschrittenen Verwesungszustands liess sich der Luchs anhand seines Fellmusters eindeutig identifizieren (Abb. 1 und 2). Er war zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem Winter 2024/2025 total 161-mal an elf verschiedenen Orten (von elf Fotofallen) nachgewiesen worden. Auf dieser Grundlage liessen sich sein Streifgebiet und seine Bewegungen im Raum nachträglich rekonstruieren (Abb. 3). Da mehrere Nachweise in unmittelbarer Nähe der Waadtländer Kantonsgrenze erfolgten, ist anzunehmen,



© Conservation Biology, Uni Bern.

Le 23 octobre 2025, je suis allé examiner et photographier la carcasse sur place. Le lendemain, j'en ai informé Nicolas Bourquin, chef du Service chasse et pêche, mais le weekend avait déjà débuté. Je suis donc remonté la récolter le lundi 27 octobre. Comme le corps était en état avancé de décomposition et dégageait une puanteur infâme, je l'ai congelé, avant de le remettre au service en question le 11 novembre 2025. Dans la foulée, j'ai envoyé un rapport circonstancié aux instances concernées, dont est issu le présent article. Par le biais de Nicolas Bourquin et de la Prof. Irene Adrian-Kalchhauser, responsable au Tierspital, j'ai appris qu'une autopsie serait effectuée. M. Nicolas Bourquin a promis de m'en remettre le rapport lorsqu'il sera disponible. On m'a réprimandé pour avoir congelé le cadavre, ce qui, vu l'état de décomposition avancé de la carcasse, était pour moi la seule option envisageable. Une congélation n'a, par ailleurs et à ma connaissance, jamais empêché de déceler des traces de plomb par passage d'un cadavre aux rayons X tandis que des analyses toxicologiques sont toujours possibles à partir d'organes congelés.

Ce cas est bien entendu embarrassant pour les milieux de la chasse valaisans qui envisagent obtenir de la Berne fédérale une autorisation de régulation du lynx, comme l'a récemment démontré Sven Papaux pour le compte du média online Watson[1,2]. La démonstration d'un quatrième acte de braconnage officiellement dénoncé en Valais (cf. faunaVS info N° 43[3] et 41[4] pour les trois premiers, en 2021 et 2022) pourrait en effet grever les chances que la Confédération entre en matière sur une telle requête. Mais ce qu'il y a de plus intriguant dans cette histoire, quelle que soit la cause du décès, c'est le lieu de la découverte et la position du cadavre.

La carcasse se trouvait au bord d'un sentier cul-de-sac, d'autant moins fréquenté qu'il est assez embuissonné. Il est dès lors vraisemblable que le lynx ne soit pas mort dans les parages, mais y ait été transporté pour une mise en scène destinée à attirer l'attention. La position du cadavre suggère qu'il a été déposé là en le manipulant par les pattes antérieures serrées l'une contre l'autre, probablement traîné ainsi depuis la place de parc de la fin de la route carrossable située quelques centaines de mètres en contrebas. Par ailleurs, l'emplacement choisi pour se débarrasser de la carcasse est situé à quelques dizaines de mètres seulement à l'aval du cœur du dispositif de piégeage érigé par Lini Paccolat (Fig. 5). C'est sur ces mêmes pièges qu'avait été découvert son ADN, entraînant sa condamnation pénale de 2015 pour chasse illégale de lynx (Arlettaz et al. 2021).

Si le mystère de la cause de la mort demeure, les circonstances indiquent a minima une mise en scène macabre. En conclusion, que les tentatives et tractations en cours visant à réguler le lynx aboutissent ou non en Valais – suite, rappelons-le, à quatre décennies de braconnage rampant avec le soutien sinon l'implication des instances officielles jusqu'en 2020 – le félin a semble-t-il toujours du souci à se faire quant à son avenir dans le canton!




Fig. 3: *Domaine vital du lynx en question au cours de quatre hivers de suivi. Il s'agit selon toute vraisemblance d'un mâle, ce qu'attesterait non seulement sa morphologie générale mais également la taille de son domaine vital.*

Abb. 3: *Streifgebiet des betreffenden Luchses während vier Monitoring-Wintern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Männchen, worauf sowohl seine allgemeine Morphologie als auch die Grösse seines Streifgebiets hindeuten.*

dass sich der Luchs zeitweise auch im angrenzenden Chablais aufgehalten hatte. Um diese Annahme zu überprüfen, wandten wir uns an KORA. Der zuständige Verantwortliche lehnte jedoch mit Hinweis auf das laufende Verfahren eine Stellungnahme ab.

Am 23. Oktober 2025 machte ich eine erste Begehung des Fundorts und machte Fotos vom Kadaver. Am folgenden Tag informierte ich Nicolas Bourquin, den Chef der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere. Da das Wochenende bereits begonnen hatte, konnte eine Bergung erst am Montag, 27. Oktober erfolgen. Aufgrund des weit fortgeschrittenen Verwesungszustands und der starken Geruchsentwicklung habe ich den Kadaver zunächst eingefroren und am 11. November 2025 dem zuständigen Dienst übergeben. Gleichzeitig habe ich den Behörden einen ausführlichen Bericht übermittelt, auf dem der vorliegende Beitrag basiert. Von Nicolas Bourquin und Prof. Irene Adrian-Kalchhauser vom Tierspital Bern wurde wurde ich informiert, dass eine pathologische Untersuchung vorgesehen sei. Es wurde mir versprochen, mir den Bericht zu überreichen, sobald er vorliegt.

Mein Entscheid, den Kadaver zwischenzeitlich einzufrieren, wurde von den Behörden nachträglich kritisiert. Angesichts des Verwesungszustands des Tiers war dieses Vorgehen für mich aber die einzige praktikable Massnahme. Zudem beeinträchtigt meines Wissens das Einfrieren weder den Nachweis von Bleiprojektilen, die mittels Röntgenuntersuchung nachgewiesen werden können, noch toxikologische Analysen der Organe.

Dieser Fall ist unangenehm für die Walliser Jagdkreise, die darauf hinarbeiten, von der Bundesbehörde in Bern eine Bewilligung zur Regulierung des Luchsbestands zu erhalten, wie Sven Papaux kürzlich im Auftrag des Online-Mediums Watson[1,2] aufgezeigt hat. Der Nachweis eines vierten offiziell dokumentierten Falls mutmasslicher Luchswilderei im Wallis nach den ersten drei Fällen in den Jahren 2021 und 2022 (vgl. fauna•vs **info** Nr. 43[3] und 41[4]) könnte die Chancen unter Umständen schmälern, dass der Bund auf ein solches Gesuch eingeht.

Besonders auffällig sind im vorliegenden Fall jedoch weniger die möglichen Todesursachen als vielmehr die Umstände des Fundortes und die Position des Kadavers. Der Tierkörper lag am Rand eines Sackgassenwegs, der nur sporadisch begangen und zudem stark überwachsen ist. Es ist plausibel, dass der Luchs nicht an dieser Stelle verendet ist, sondern post mortem dorthin gebracht wurde. Die Lage des Kadavers spricht dafür, dass das Tier an den Vorderläufen fixiert transportiert oder gezogen wurde, vermutlich ausgehend vom wenige hundert Meter entfernt gelegenen Parkplatzes am Ende der befahrbaren Strasse. Der Ablageort befindet sich zudem nur wenige Dutzend Meter unterhalb des Zentrums einer ehemaligen Schlingenfalle, die einst von Lini Paccolat benutzt wurde (Abb. 5). An eben dieser Falle konnte dereinst DNA von Paccolat nachgewiesen werden, was 2015 zu seiner strafrechtlichen Verurteilung wegen illegaler Luchsjagd führte (Arlettaz et al. 2021).



Fig. 2: *Ce lynx était encore présent au sein de notre dispositif de suivi lors de l'hiver 2024-2025 (cliché du 9 septembre 2024). Encart: son patron de pelage était très distinctif. © Conservation Biology, Uni Bern.*

Abb. 2: *Dieser Luchs wurde im Rahmen unseres Monitorings noch im Winter 2024/2025 nachgewiesen (Aufnahme vom 9. September 2024). Beachtenswert: Sein Fellmuster war sehr charakteristisch. © Conservation Biology, Uni Bern.*

Unabhängig von der letztlichen Klärung der Todesursache deuten die Umstände somit mindestens auf eine gezielte Platzierung des Kadavers hin. Ob die laufenden Bestrebungen zur Regulierung des Luchsbestands im Wallis letztlich erfolgreich sein werden oder nicht, bleibt offen. Vor dem Hintergrund mehrerer Jahrzehnte dokumentierter Wilderei, die bis in die jüngere Vergangenheit hinein zumindest teilweise unzureichend aufgearbeitet wurde, bleibt die Situation für die Art im Kanton jedenfalls fragil.

Aber ich möchte diesen Artikel mit einem positiven Aspekt abschliessen. In den 2010er-Jahren gab es im Wallis nur noch fünf bis acht Luchse, und die Fortpflanzung war praktisch zum Erliegen gekommen. Südlich der Rhone kam die Art gar nicht mehr vor, obwohl dort Ende der 1980er-Jahre noch mehrere Tiere lebten (Untersuchungen von Heinrich Haller). Im Jahr 2025 hingegen zählte die Population gemäss den Aufzeichnungen unserer Fotofallen 30 eigenständige Luchse und acht Würfe mit insgesamt mindestens elf Jungtieren. Dass mein Labor all diese Wildereiaktivitäten, die lange Zeit verschwiegen wurden, aufgedeckt hat, hat schliesslich Früchte getragen. Dazu beigetragen haben wahrscheinlich auch bedeutende Veränderungen in der kantonalen Governance seit Beginn der 2020er-Jahre.

Abschliessend sei den Mitarbeitenden Valentin Debons und Stijn Verschueren für ihre sorgfältige Datenaufbereitung und die Identifikation der Luchse gedankt. ■

Prof. Dr. Raphaël Arlettaz, Conservation Biology, Universität Bern



Fig. 4: La carcasse de lynx trouvée sur les hauts de Dorénaz le 20 octobre 2025. Elle était déjà en état de décomposition avancée. © Raphaël Arlettaz, 23 octobre 2025.

Abb. 4: Der am 20. Oktober 2025 oberhalb von Dorénaz aufgefundene Luchskadaver. Er befand sich bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. © Raphaël Arlettaz, 23.Oktober 2025.

Mais finissons sur une touche positive. Alors que l'on ne comptait plus que 5-8 lynx en Valais durant les années 2010, avec quasi plus de reproduction, et alors que l'espèce n'était plus présente au sud du Rhône où plusieurs individus vivaient pourtant encore à la fin des années 1980 (recherches de Heinrich Haller), en 2025 la population comptait, selon les relevés de nos pièges-photo, 30 lynx indépendants et 8 portées totalisant au moins 11 jeunes. La démonstration par mon laboratoire de toutes ces activités de braconnage longtemps passées sous silence a donc fini par porter ses fruits, probablement favorisée par d'importants changements au niveau de la gouvernance cantonale au tournant de la décennie 2020.

Je remercie Valentin Debons et Stijn Verschueren pour leur précieux travail d'archivage et d'identification. ■

Prof. Dr Raphaël Arlettaz, Biologie de la Conservation, Université de Bern

La vérité sur les lynx valaisans

Lettre de lecteur de Raphaël Arlettaz, parue dans Le Nouvelliste du 2 juillet 2026

La Fédération des chasseurs et notre Gouvernement souhaiteraient réguler le lynx en Valais. L'Etat en a confié le monitoring au KORA. Or, le KORA n'opère jamais de suivi sur l'ensemble du territoire valaisan chaque année et ne livre aucune information par canton. Ses estimations d'effectif et de densité pour le Nord-Ouest du Rhône incluent de vastes secteurs comprenant les Alpes bernoises et vaudoises. Nos dirigeants reprennent sans sourciller ces chiffres «gonflés». Mon équipe à l'Uni de Berne investigue les interactions carnivores-ongulés depuis 2011 sur tout le Valais, au moyen de pièges-photo, disposant ainsi des estimations d'effectifs les plus actuelles. Le lynx a été systématiquement braconné en Valais durant quatre décennies, avec la complicité et l'implication d'agents assermentés de l'Etat. Nos recherches ont permis la condamnation d'un chasseur en 2015: l'Etat savait depuis longtemps mais n'a rien fait. A la fin des années 2010, le braconnage a enfin diminué. Il reste toutefois d'actualité: trois cas officiellement déclarés vers 2021, dont deux victimes d'armes de chasse; plus deux probables en 2025. Suite à la condamnation pénale de 2015 et à sa médiatisation, les effectifs ont repris car la justice instruisait enfin ces cas grâce à une nouvelle gouvernance étatique (Favre et Bourquin). En 2025, le Valais abritait 30 lynx indépendants ainsi que 8 portées totalisant au moins 11 jeunes. En 2010-2018, ils n'étaient plus que 5-8 lynx adultes, avec seulement deux portées au total: l'extinction menaçait. Depuis 2025, conséquence d'une augmentation de densité au Nord du Rhône, le lynx disperse et recolonise le Valais méridional d'où le braconnage l'avait éradiqué alors qu'il y était encore bien présent dans les années 1980. Voilà la réalité valaisanne!




Fig. 5: *Lieu de découverte du lynx en question (point rouge) par rapport au réseau de 17 pièges à collet (points orange) opérationnel dans ce secteur durant plus de deux décennies. Tout indique que cette carcasse de lynx a été amenée là dans l'optique d'une mise en scène provocatrice. © Conservation Biology, Uni Bern.*

Abb. 5: *Fundort des toten Luchses (roter Punkt) im Verhältnis zum Netz von 17 Drahtschlingen (orange Punkte), die in diesem Gebiet während mehr als zwei Jahrzehnten in Betrieb waren. Vieles deutet darauf hin, dass der Luchskadaver gezielt dorthin verbracht wurde, um eine provokative Inszenierung zu schaffen. © Conservation Biology, Uni Bern.*

Bibliographie / Literatur

Arlettaz, R., G. Chapron, M. Kéry, E. Klaus, S. Mettaz, S. Roder, S. Vignali, F. Zimmermann & V. Braunisch (2021). Poaching threatens the establishment of a lynx population, highlighting the need of a centralized judiciary approach. Frontiers in Conservation Science. DOI 10.3389/fcosc.2021.665000

Sources / Quellen

1) www.watson.ch/fr/suisse/politique/362322435-valais-un-tir-de-regulation-du-lynx-serait-en-discussion
2) www.watson.ch/fr/suisse/animaux/258718964-le-retour-du-lynx-en-valais-revele-des-zones-d-ombre
3) www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=44&resource_link_id=309
4) www.fauna-vs.ch/?action=get_file&id=44&resource_link_id=30a

Die Wahrheit über die Walliser Luchse

Leserbrief von Raphaël Arlettaz, erschienen im Walliser Boten vom 2. Juli 2026

Im Wallis ist die Rede davon, den Luchsbestand zu regulieren. Der Kanton hat KORA mit der Überwachung der Luchse beauftragt. Leider führt KORA im Wallis aber nicht jedes Jahr eine flächendeckende Überwachung durch und liefert keine kantonsspezifischen Informationen. Die Schätzungen zur Populationsdichte nordwestlich der Rhône umfassen auch die Berner und Waadtländer Alpen. Mein Team an der Universität Bern untersucht seit 2011 im ganzen Wallis mithilfe von Fotofallen die Wechselwirkungen zwischen Raub- und Huftieren und verfügt über die genauesten und aktuellsten Bestandsschätzungen. Luchse wurden im Wallis vier Jahrzehnte lang systematisch gewildert, unter Mitwirkung vereidigter Staatsbeamter. Unsere Forschungen führten 2015 zur Verurteilung eines Jägers: Der Staat wusste schon lange davon, hat aber nichts unternommen. Danach ging die Wilderei zurück, ist aber nach wie vor aktuell: drei offizielle Fälle im Jahr 2021, davon zwei mit Jagdwaffen, und zwei mutmassliche Fälle aus dem Jahr 2025. Dank der Verurteilung von 2015 und der damit verbundenen Medienberichte hat sich der Bestand erholt. 2025 lebten im Wallis 30 unabhängige Luchse. Es gab auch 8 Würfe mit mindestens 11 Jungen. In den Jahren 2010–18 gab es nur 5–8 unabhängige Luchse mit total zwei Würfen. Seit 2025 breitet sich der Luchs – als Folge einer zunehmenden Population nördlich der Rhône – aus und besiedelt das südliche Wallis, wo er durch Wilderei ausgerottet worden war, obwohl er dort in den 1980er-Jahren verbreitet war.

Gypaète barbu en Suisse occidentale: bilan de la saison de nidification 2025

La saison 2025 de suivi du Gypaète barbu *(Gypaetus barbatus)* dans les cantons du Valais, Vaud, Fribourg et Berne fut contrastée, tant en termes de succès reproducteur que de dynamique des couples et des individus observés. Cet article est tiré de «Monitoring du Gypaète barbu en Suisse occidentale: rapport 2025» (Luisier 2026).

En 2025, sept couples ont mené un jeune à l'envol, trois ont échoué et deux n'ont pas entamé de nidification. La première nidification réussie du couple du Bas Mattertal constitue l'un des faits marquants de l'année, portant à douze le nombre de couples ayant niché avec succès au moins une fois dans la région. L'envol le plus précoce jamais documenté dans la région a également été observé en Basse Lizerne, où le jeune Malyjomel s'est envolé le 4 juin 2025 depuis le nid occupé à l'altitude la plus basse de la zone d'étude. Néanmoins, un nombre élevé d'échecs a marqué la saison. L'échec du couple de Saas, qui avait pourtant niché avec succès chaque année depuis 2019, est survenu peu après l'éclosion, sans cause clairement identifiée. Les échecs de Niedergesteln et de Stalden semblent résulter d'une combinaison de conditions météorologiques défavorables, de perturbations humaines et, pour ce dernier, de l'inexpérience du mâle, un jeune subadulte dans sa 5e année seulement, alors que l'âge moyen de la première nidification est de 8 à 9 ans. Le Haut Valais a donc connu trois des quatre échecs de nidification suisses en 2025. Parallèlement, de nombreux couples sont en phase d'installation, certains ayant même déjà construit des nids sans débuter de nidification ou parvenir à mener une nidification à terme.

Méthode du suivi de la nidification

Le suivi des gypaètes barbus dans les cantons du Valais, Vaud, Fribourg et le district de Saanen (BE) repose sur la collecte centralisée d'observations issues des groupes de suivis, de plateformes spécialisées, de la Fondation Pro Gypaète et de diverses contributions directes. Les individus marqués ou équipés de balises font l'objet d'un suivi précis, tandis que les autres sont identifiés grâce à l'archivage et à la comparaison de photographies, permettant de reconnaître la majorité des couples territoriaux. Le suivi de la nidification est réalisé conformément aux recommandations de l'IBM (International Bearded Vulture Monitoring 2025), avec pour objectif de documenter les étapes clés de la reproduction tout en limitant le dérangement, notamment en respectant une distance d'observation d'au moins 600 à 700 m par rapport au nid. Chaque couple est suivi par un responsable en coordination avec un coordinateur régional, qui organise au minimum deux observations saisonnières depuis des points fixes adaptés. Par ailleurs, la recherche de nouveaux couples est activement menée sur le terrain, notamment via des prospections coordonnées entre plusieurs observateurs afin d'identifier les sites de nidification et mieux comprendre




***Fig. 1:** Répartition des observations en 2025 // Verteilung der Beobachtungen 2025*

Bartgeier in der Westschweiz: Bilanz der Brutsaison 2025

Die Saison 2025 des Bartgeiers *(Gypaetus barbatus)* in den Kantonen Wallis, Waadt, Freiburg und Bern verlief bei den verschiedenen Paaren unterschiedlich, sowohl hinsichtlich des Fortpflanzungserfolgs als auch der Dynamik der Paare und Individuen. Dieser Artikel stammt aus «Monitoring des Bartgeiers in der Westschweiz: Bericht 2025» (Luisier 2026).

Im Jahr 2025 brachten sieben Bartgeierpaare erfolgreich einen Jungvogel zum Ausfliegen, drei scheiterten und zwei begannen keine Brut. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen war die erste erfolgreiche Brut im unteren Mattertal, womit sich die Zahl der Paare in der Westschweiz, die mindestens einmal erfolgreich gebrütet haben, auf zwölf erhöhte. Zudem wurde im Gebiet Basse Lizerne der früheste in der Westschweiz dokumentierte Ausflug beobachtet: Der Jungvogel Malyjomel flog am 4. Juni 2025 aus dem Nest, das zugleich der am tiefsten gelegene Brutstandort des Untersuchungsgebiets ist. Sonst war die Saison aber von einer hohen Anzahl an Misserfolgen geprägt. Das Scheitern des Paares von Saas, das seit 2019 jedes Jahr erfolgreich gebrütet hatte, trat kurz nach dem Schlupf ein, ohne eindeutig identifizierte Ursache. Die Misserfolge in Niedergesteln und Stalden scheinen auf eine Kombination aus ungünstigen Wetterbedingungen, menschlichen Störungen und, in Stalden, auf die Unerfahrenheit des Männchens zurückzuführen zu sein. Es handelte sich um ein junges subadultes Tier im fünften Lebensjahr, während das durchschnittliche Alter für die erste Brut bei acht bis neun Jahren liegt. Somit lagen drei der vier Brutmisserfolge im Oberwallis. Gleichzeitig befinden sich zahlreiche Paare in der Ansiedlungsphase; einige haben bereits Nester gebaut, ohne jedoch eine Brut zu beginnen oder erfolgreich abzuschliessen.

Methode des Brutmonitorings

Die Überwachung der Bartgeier in den Kantonen Wallis, Waadt, Freiburg sowie im Bezirk Saanen (BE) basiert auf der zentralisierten Sammlung von Beobachtungen aus Monitoringgruppen, spezialisierten Plattformen, der Stiftung Pro Bartgeier und verschiedenen direkten Meldungen. Markierte oder mit Sendern ausgestattete Vögel werden gezielt verfolgt, während andere anhand archivierter und verglichener Fotografien identifiziert werden, wodurch die meisten territorialen Paare erkannt werden können. Das Brutmonitoring erfolgt gemäss den Empfehlungen des IBM (International Bearded Vulture Monitoring 2025) mit dem Ziel, die wichtigsten Phasen der Fortpflanzung zu dokumentieren und gleichzeitig Störungen zu minimieren, insbesondere durch die Einhaltung eines Beobachtungsabstands von mindestens 600 bis 700 Metern zum Nest. Jedes Paar wird von einer verantwortlichen Person in enger Zusammenarbeit mit einer regionalen Koordination betreut, wobei mindestens zwei saisonale Beobachtungen von festgelegten, geeigneten Standorten aus organisiert werden. Zudem wird aktiv nach neuen Paaren gesucht, insbesondere durch koordinierte Feldbegehungen mehrerer Beobachtender, um Brutplätze zu lokalisieren und das Verhalten der Vögel besser zu verstehen. Im weiteren Verlauf des Artikels wird der Begriff «Paar» sowohl für Paare als auch für Trios verwendet.

Verteilung der Beobachtungen

Im Vergleich zu 2023 und 2024 hat sich die räumliche Verteilung der Beobachtungen nur wenig verändert (Abb. 1). Obwohl sich die meisten Beobachtungen von Bartgeiern im Wallis weiterhin auf die rechte Talseite oberhalb von Martigny und in der Nähe etablierter Paare konzentrieren, setzt sich die Besiedlung der linken Talseite fort, mit einer zunehmenden Zahl von Beobachtungen in den Seitentälern. Besonders zahlreich waren die Beobachtungen im hinteren Teil der Täler von Hérens und Anniviers. Auch auf der rechten Talseite zwischen Leuk und Brig hat die Zahl der Beobachtungen deutlich zugenommen. In den Voralpen nehmen die Beobach-tungen ebenfalls zu, wobei sich diese weiterhin vor allem auf die Regionen Val d'Illiez (VS), Vouvry (VS) und Schwarzsee (FR) konzentrieren. Das Auftreten neuer Hotspots in den letzten zwei Jahren, wie die Region Leysin/Jaman (VD), der Col du Pillon (VD/BE) und die Höhenlagen von Rougemont (VD/FR), ist hervorzuheben. Es ist zudem das erste Jahr, in dem eine bedeutende Anzahl von Beobachtungen östlich von Brig, insbesondere auf der rechten Talseite, verzeichnet wurde – und dies trotz sehr geringer Beobachtungsintensität.

Details zu den Bruten

Von den elf Paaren, die in der Vergangenheit mindestens einmal gebrütet haben, legten neun im Winter 2024/25 Eier. Das Paar im unteren Mattertal versuchte erstmals zu brüten und hatte Erfolg. Trotz Anwesenheit in Nestnähe brüteten die Paare von Leukerbad und Haute Lizerne nicht. Von den zehn Paaren mit gesicherter Eiablage führten sieben einen Jungvogel zum Ausfliegen. 2025 ist damit das zweitbeste Jahr nach 2024 und 2023, die jeweils acht Jungvögel verzeichneten. Dennoch bleibt die Anzahl der Jungvögel im Verhältnis zur Zahl der überwachten Paare gering. In den Alpen liegt die Produktivität, also der Anteil der Paare, die einen Jungvogel zum Ausfliegen bringen, normalerweise bei 70 %, im Beobachtungsgebiet jedoch nur bei 58 %. Der Bruterfolg, also der Anteil der begonnenen Bruten, die erfolgreich abgeschlossen werden, beträgt üblicherweise 75 %, hier 70 % (Lauper 2025). Hervorzuheben ist zudem der früheste jemals in der Region dokumentierte Ausflug am 4. Juni 2025 von Malyjomel, dem Jungvogel des Paars Basse Lizerne. Der bisherige Rekord

le comportement des individus. Dans la suite de l'article, le terme «couple» est utilisé aussi bien pour les couples que pour les trios.

Répartition des observations

Par rapport à 2023 et 2024, la répartition des observations a peu changé (Fig. 1). Bien que la majorité des observations de Gypaètes barbus en Valais se concentre toujours en rive droite du Rhône en amont de Martigny et proche des couples établis, la colonisation de la rive gauche se poursuit, avec un nombre croissant d'observations dans les vallées latérales. Les observations se sont faites particulièrement nombreuses dans le fond des Vals d'Hérens et d'Anniviers. La rive droite entre Loèche et Brigue a également vu son nombre d'observations augmenter considérablement. Dans les Préalpes, les observations sont en augmentation et ce sont toujours les régions du Val d'Illiez (VS), de Vouvry (VS) et du Lac Noir (FR) qui en concentrent la plupart. L'apparition de nouveaux points chauds ces deux dernières années comme la région de Leysin/Jaman (VD), celle du col du Pillon (VD/BE) et les hauts de Rougemont (VD/FR) est à relever. C'est la première année où un nombre important d'observations a été réalisé en amont de Brigue, plus particulièrement en rive droite, et ce, malgré la très faible pression d'observation.

Détails de nidifications 2025

Sur les onze couples ayant niché par le passé au moins une fois, neuf ont pondus pendant l'hiver 2024/25. Le couple du Bas Mattertal a tenté et réussi sa première nidification. Malgré une présence autour du nid, les couples de Leukerbad et Haute Lierzne n'ont pas niché. Sur les dix couples ayant pondu avec certitude, sept ont mené un jeune à l'envol. L'année 2025 est la deuxième meilleure année après 2024 et 2023, qui avaient comptabilisé huit jeunes à l'envol. Il s'agit cependant d'un faible nombre de jeunes par rapport au nombre de couples suivis. En effet, dans les Alpes, la productivité, soit le pourcentage de couples produisant un jeune à l'envol, est en général de 70 % contre 58 % ici, et le succès de reproduction, soit le pourcentage de couples qui réussissent une nidification entreprise, de 75 % contre 70 % ici (Lauper 2025). On notera également l'envol le plus précoce jamais documenté dans notre région, soit le 04.06.2025, de Malyjomel, le jeune de Basse Lizerne (div. obs.). L'ancien record datait du 06.06.2023 pour le couple de Niedergesteln (R. Bellwald). L'envol alpin le plus précoce jamais observé a eu lieu le 29 mai 2025 au Tessin. Les envols avant le 5 juin sont très rares dans les Alpes (IBM 2026).


© Valentin Debons

***Fig. 2**: Mâle de Stalden avant le début de la nidification le 07.01.2025. Il n'est que dans sa 5ème année.*

***Abb. 2:** Männchen (erst in seinem 5. Lebensjahr) aus Stalden vor Beginn der Brutzeit am 07.01.2025.*

La meilleure nouvelle de l'année fut la découverte du site de nidification du couple du Bas Mattertal lors d'une prospection ciblée (S. Briggeler, M. Chesaux, C. Luisier, B. Mooser, A. Salamin, M. Vogel, J. Wildi). Il s'agit du couple qui a séjourné puis construit des nids dans le Val d'Anniviers pendant plusieurs années avant de changer de vallée (A. Salamin, T. Nierle, B. Zuffrey). Le jour de la découverte, un troisième individu, visiblement subadulte, s'est posé sur le nid et s'est occupé du jeune. Ce troisième individu a été revu ponctuellement durant le reste de la nidification (K. Agten).

Les couples n'ayant pas tenté de nicher ont tous deux perdu leur femelle pondeuse avant le début de la nidification. Pour le couple de Haute Lizerne, Guillaumes, après avoir été relâchée en novembre 2024 suite à un accident, n'a jamais réintégré le trio et a été remplacée en cours de saison par un autre individu. À Leukerbad, après de multiples accouplements (div. obs.), la femelle pondeuse a disparu dans le courant du mois de janvier. Le mâle a ensuite été régulièrement vu avec un autre individu et la deuxième femelle du trio.

Parmi les trois couples qui ont échoué, le plus inattendu est l'échec du couple de Saas. En effet, ce couple niche avec succès chaque année depuis sa première nidification documentée en 2019. Le jeune semble être mort dans les jours qui ont suivi l'éclosion. Bien qu'un photographe et des amateurs de cascade de glace aient été vus au pied de la falaise sous le nid, la cause de l'échec semble naturelle. Le couple de Niedergesteln, qui avait déjà échoué en 2024, a quant à lui échoué plus tard dans le processus de nidification. La période de l'échec, le 09.04.2025 ± 18 jours, pourrait coïncider avec les chutes de neige exceptionnelles d'avril 2025 et avec une forte présence de parapentes au-dessus de la zone de nidification, liée à une compétition internationale ponctuelle (K. Agten). Des traces ont également été vues monter sous le nid lors d'un contrôle pendant la couvaison (V. Debons), la présence d'un curieux s'approchant régulièrement trop près du nid n'est donc pas à exclure. Le troisième couple, celui de Stalden, a échoué après un peu plus d'un mois de couvaison. Alors qu'un individu du couple avait déjà disparu en 2023, le mâle du couple avait

Tab. 1: Tableau récapitulatif de la saison de nidification 2025. Les couples bernois sont aussi mentionnés à titre indicatif.
Tab. 1: Übersichtstabelle der Brutsaison 2025. Die Berner Paare sind zu Informationszwecken ebenfalls aufgeführt.

Territoire	Première nidification réussie Erste erfolgreiche Brut	Ponte / Eiablage (± jours / Tage)	Eclosion / Schlupf (± jours / Tage)	Envol / Ausflug (± jours / Tage)
Haute Lizerne	2007	-	-	-
Basse Lizerne	2012	29.12.2024 (± 5)	19.02.2025 (± 1)	04.06.2025 (± 0)
Leukerbad	2015	-	-	-
Zermatt	2016	01.01.2025 (± 30)	01.03.2025 (± 30)	23.06.2024 (± 2)
Bagnes	2016	15.02.2025 (± 15)	15.04.2025 (± 15)	25.07.2025 (± 3)
Ayent	2019	25.12.2024 (± 10)	28.02.2024 (± 7)	19.06.2024 (± 4)
Coude du Rhône	2019	05.02.2025 (± 10)	05.04.2024 (± 10)	23.07.2025 (± 5)
Saas	2019	26.12.2024 (± 0)	19.02.2025 (± 2)	échec / Abbruch
Kandertal	2020	08.01.2025 (± 0)	03.03.2024 (± 0)	29.06.2024 (± 0)
Niedergesteln	2023	04.01.2025 (± 17)	15.02.2025 (± 10)	échec / Abbruch
Val Ferret	2023	11.01.2025 (± 1)	05.03.2025 (± 1)	22.06.2025 (± 0)
Stalden	2024	20.02.2025 (± 2)	échec / Abbruch	échec / Abbruch
Lauterbrunnen	2024	-	-	-
Unteres Mattertal	2025	17.01.2025 (± 5)	15.03.2025 (± 5)	20.06.2025 (± 0)

stammte vom 6. Juni 2023 beim Paar von Niedergesteln (R. Bellwald). Der früheste jemals in den Alpen beobachtete Ausflug erfolgte am 29. Mai 2025 im Tessin. Ausflüge vor dem 5. Juni sind in den Alpen sehr selten (IBM 2026).

Die beste Nachricht des Jahres war die Entdeckung des Brutplatzes des Paars im unteren Mattertal während einer gezielten Exkursion (S. Briggeler, M. Chesaux, C. Luisier, B. Mooser, A. Salamin, M. Vogel, J. Wildi). Dieses Paar hatte zuvor über mehrere Jahre im Val d'Anniviers gelebt und dort Nester gebaut, bevor es das Tal wechselte (A. Salamin, T. Nierle, B. Zuffrey). Am Tag der Entdeckung landete ein dritter, offenbar subadulter Vogel am Nest und kümmerte sich um den Jungvogel. Dieser Bartgeier wurde während der weiteren Brutzeit gelegentlich erneut beobachtet (K. Agten).

Bei den nicht brütenden Paaren kam es vor Beginn der Brutsaison jeweils zum Verlust des eierlegenden Weibchens. Beim Paar Haute Lizerne wurde Guillaumes nach einem Unfall im November 2024 wieder freigelassen, kehrte jedoch nicht in das Trio zurück und wurde im Verlauf der Saison durch einen anderen Bartgeier ersetzt. In Leukerbad verschwand das Weibchen nach mehreren Kopulationen im Januar. Das Männchen wurde anschliessend regelmässig mit einem anderen Individuum sowie dem zweiten Weibchen des Trios beobachtet.

Von den drei gescheiterten Bruten war der Misserfolg des Paars von Saas der unerwartetste, da dieses seit seiner ersten dokumentierten Brut 2019 jährlich erfolgreich gebrütet hatte. Der Jungvogel scheint wenige Tage nach dem Schlupf gestorben zu sein. Obwohl ein Fotograf sowie Eiskletterer am Fusse der Felswand unter dem Nest beobachtet wurden, deutet vieles auf eine natürliche Ursache hin. Das Paar von Niedergesteln, das bereits 2024 gescheitert war, brach die Brut später im Verlauf der Saison ab. Der Zeitpunkt des Misserfolgs am 9. April 2025 (± 18 Tage) könnte mit den aussergewöhnlichen Schneefällen im April 2025 sowie einer grossen Präsenz von Gleitschirmen über dem Brutgebiet im Zusammenhang mit einem internationalen Wettkampf zusammenhängen (K. Agten). Zudem wurden während einer Kontrolle während der Brutzeit Spuren unterhalb des Nests festgestellt (V. Debons), was auf wiederholte Störungen durch eine sich dem Nest nähernde Person hindeutet.

Das dritte Paar, jenes von Stalden, scheiterte nach etwas mehr als einem Monat Brutzeit. Nachdem bereits 2023 ein Vogel des Paars verschwunden war und das Männchen 2024 vor Ende der Brutzeit ebenfalls fehlte, wurde es durch ein kaum subadultes Männchen im vierten Lebensjahr ersetzt (Abb. 2). Das Paar mit dem jungen Männchen (nun im fünften Lebensjahr) legte spät im Februar Eier. Ein Brutversuch in diesem Alter wurde bisher nur einmal dokumentiert (Fasce & Fasce 2011), während ein gleichaltriges Weibchen bereits einmal erfolgreich gebrütet hat (Fasce 2020). Während der Brutphase wurde das Männchen wiederholt beim unzureichenden Brüten beobachtet, begleitet von auffälligen Unbehagensbewegungen. Der Misserfolg wurde zunächst seiner Unerfahrenheit zugeschrieben, bis Hinweise auf die regelmässige Anwesenheit eines Filmemachers in etwa 150 m Entfernung zum Nest diese Hypothese relativierten. Die genaue Ursache des Brutabbruchs bleibt unklar, wahrscheinlich handelt es sich um eine Kombination beider Faktoren.

Weitere territoriale Paare

Vier Paare besitzen bereits einen Horst, haben jedoch noch nie erfolgreich gebrütet. Unter ihnen scheint das Paar am Simplon am weitesten in Richtung einer erfolgreichen Brut fortgeschritten zu sein. Es legte im Januar in einem sehr ex-

disparu avant la fin de la nidification en 2024. Il avait été rapidement remplacé par un mâle à peine subadulte, alors dans sa 4e année (Fig. 2). Le couple, avec le nouveau mâle alors dans sa 5e année, a pondu tardivement en février. Une tentative de nidification pour un mâle aussi jeune n'avait été constatée qu'à une seule reprise jusque-là (Fasce & Fasce 2011), alors qu'une femelle du même âge a déjà niché une fois avec succès (Fasce 2020). Durant la couvaison, le mâle a régulièrement été observé ne couvant pas correctement, effectuant comme des mouvements d'inconfort. L'échec a d'abord été attribué à l'inexpérience du mâle, jusqu'à ce que l'information sur la présence régulière d'un cinéaste à 150 m du nid vienne éroder cette hypothèse. La raison exacte de l'échec de la nidification n'est donc pas connue, mais il s'agit probablement d'un mélange de ces deux causes.

Autres couples cantonnés

Quatre couples possèdent déjà un nid, mais n'ont jamais niché avec succès, parmis eux, le couple du Simplon semble être le plus avancé vers une nidification réussie. Il a pondu en janvier dans un nid très exposé, mais la nidification a vite échoué suite au fort harcèlement des Aigles royaux locaux (J. Theler). Le mâle du couple est Freduleli, un oiseau relâché à Melchsee Frutt en 2018. Il a perdu son GPS en automne lors d'une escapade en France. Dans les Préalpes bernoises, le mâle du couple de Gsteig, Gregoria-Jordan, a au moins deux nids connus avec sa partenaire (J. Wildi, N. Auchli, F. Blum, C. Luisier). Il s'agit du premier jeune envolé dans le canton de Berne depuis le début du programme de réintroduction, en 2020. Des couples avec un nid sont aussi cantonnés dans le Val d'Anniviers et d'Hérens. Dans de nombreuses autres régions, des observations ou des photos reçues laissent penser que des couples sont en cours d'installation ou déjà installés. C'est particulièrement le cas dans le fond de la vallée de Conches, où des adultes sont observés régulièrement depuis plus de quatre ans, mais aussi dans la région de Brigue et dans le Canton de Vaud, où des transports de matériel ont probablement été observés (div. obs.). Avec douze territoires concernés par une possible installation à des degrés d'avancement divers, tous les secteurs de notre région semblent à présent abriter des oiseaux potentiellement nicheurs.

Autres faits marquants

Depuis son plus jeune âge, Finja (Fig. 3), relâchée à Melchsee-Frutt en 2018, est souvent observée en Valais. Pendant plus d'une semaine en janvier 2025, elle a été observée en train d'interagir avec le couple de Leukerbad (P. Schwitter et al.). En avril, elle a perdu son GPS, mais elle a été revue posée sur le nid du couple du Coude du Rhône mi-novembre, alors que la femelle du couple était dans le secteur (C. Luisier, J. Wildi). Elle avait déjà beaucoup séjourné dans le secteur en fin d'automne 2024.

Aiolos a fait sensation parmi les observateurs. Sixième jeune du couple bernois, et par conséquent le frère cadet de Gregoria-Jordan, il a été récupéré au bord d'un ruisseau par le garde-faune local après s'être posé sur un toit. Muni de bagues et d'une balise, il s'est ensuite dirigé vers la région de Leukerbad (VS), où il est resté pendant plus d'un mois avant d'en faire de même dans la région du Coude du Rhône (VS). Cet individu particulièrement curieux s'est beaucoup fait remarquer, approchant de très près et parfois se posant à quelques mètres devant l'observateur.

Conclusion

La saison de nidification 2025 confirme à la fois la solidité du noyau reproducteur de Gypaètes barbus en Suisse occidentale et la fragilité persistante de cette population encore en phase de croissance. Une faible hausse de la mortalité des adultes reproducteurs pourrait inverser la tendance positive observée ces dernières années (Schaub et al. 2024). Avec au moins deux femelles pondeuses disparues en 2025, nous n'en sommes probablement pas loin. Les résultats de la reproduction se situent dans la continuité des bonnes performances observées ces dernières années, tout en révélant une faible productivité (58 %) par rapport à la moyenne alpine (70 %). Les données recueillies soulignent l'importance déterminante du suivi coordonné et standardisé, qui permet non seulement de documenter précisément les étapes clés de la reproduction, mais aussi d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer son succès. Les échecs de nidification observés en 2025 illustrent la complexité des causes en jeu, où s'entremêlent conditions naturelles, dynamique sociale des couples, âge et expérience des individus, ainsi que pressions anthropiques parfois difficiles à quantifier, mais bien présentes. Ces résultats contrastés s'accompagnent d'une forte pression humaine provoquant de nombreux dérangements au nid. La répétition de situations de dérangement sur de nombreux nids observés en 2025 rappelle la nécessité de renforcer les mesures de prévention, d'information et de sensibilisation, en complément du suivi biologique. L'augmentation du nombre de couples en installation et la présence d'oiseaux potentiellement nicheurs dans l'ensemble des secteurs de la région témoignent toutefois d'une dynamique spatiale positive. ■

Célestin Luisier, Réseau Gypaète Suisse occidentale

Références // Literatur

Fasce, P. & L. Fasce (2011): Reproduction précoce d'un couple de *Gypaète Gypaetus barbatus* dans le Valsava renche (Parc National du Grand Paradis, Aoste, Italie). Nos Oiseaux 58: 199-202.

Fasce, P. (2020): Nidification très précoce d'une femelle de Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Nos Oiseaux 67: 218-219.

IBM (2026): International Bearded Vulture Monitoring. www.gyp-monitoring.com/index.php

Lauper, M. (2025): Annual Report 2024 - International Bearded Vulture Monitoring (IBM); ed. Vulture Conservation Foundation. pp. 56.

Luisier C. (2026): Monitoring du Gypaète barbu *(Gypaetus barbatus)* en Suisse occidentale: rapport 2025. Monitoring des Bartgeiers *(Gypaetus barbatus)* in der Westschweiz: Bericht 2025. Disponible chez / erhältlich bei: Céléstin Luisier, celestin.luisier@gypaetebarbu.ch

Schaub, M., Loercher, F., Hegglin, D. & Arlettaz, R. (2024): Demographic assessment of reintroduced bearded vultures in the Alps: Success in the core, challenges in the periphery. Ecological Solutions and Evidence, 5, e12347. https://doi.org/10.1002/2688-8319.12347



Fig. 3: *Finja à la Gemmi le 18.01.2025.*

Abb. 3: *Finja auf der Gemmi am 18.01.2025.*

ponierten Horst ein Ei, doch die Brut scheiterte schon bald infolge starker Störungen durch Steinadler (J. Teller). Das Männchen dieses Paares ist Freduleli, ein 2018 in Melchsee-Frutt ausgewilderter Vogel. Es verlor seinen GPS-Sender im Herbst während eines Ausflugs nach Frankreich.

In den Berner Voralpen hat das Männchen des Paars von Gsteig, Gregoria-Jordan, mindestens zwei bekannte Horste mit seiner Partnerin (J. Wildi, N. Auchli, F. Blum, C. Luisier). Dabei handelt es sich um den ersten im Kanton Bern seit Beginn des Wiederansiedlungsprogramms im Jahr 2020 flügge gewordenen Jungvogel. Auch im Val d'Anniviers und im Val d'Hérens sind Paare mit bekannten Horsten etabliert.

In zahlreichen weiteren Regionen deuten Beobachtungen und eingegangene Fotos darauf hin, dass sich Paare in der Ansiedlungsphase befinden oder bereits etabliert sind. Dies gilt insbesondere für das Goms, wo seit mehr als vier Jahren regelmässig adulte Individuen beobachtet werden, sowie für die Region Brig und den Kanton Waadt, wo vermutlich auch Materialtransporte festgestellt wurden. Mit zwölf Gebieten, in denen eine Ansiedlung in unterschiedlichem Stadium vermutet wird, scheinen inzwischen alle Sektoren der Region potenzielle Brutvögel zu beherbergen.

Weitere bemerkenswerte Ereignisse

Seit frühester Jugend wird Finja (Abb. 3), 2018 in Melchsee-Frutt ausgewildert, regelmässig im Wallis beobachtet. 2025 wurde sie während mehr als einer Woche in Interaktion mit dem Paar von Leukerbad beobachtet (P. Schwitter und andere). Im April verlor sie ihren GPS-Sender, wurde jedoch im November auf dem Nest des Paars am Coude du Rhône gesichtet, während sich das Weibchen des Paars im Gebiet aufhielt (C. Luisier, J. Wildi). Bereits im Spätherbst 2024 hielt sie sich wiederholt längere Zeit in diesem Gebiet auf.

Aiolos sorgte bei den Beobachtenden für besondere Aufmerksamkeit. Als sechster Jungvogel des Berner Paars und damit jüngerer Bruder von Gregoria-Jordan wurde er nach einer Landung auf einem Dach von einem lokalen Wildhüter an einem Bachlauf aufgenommen. Ausgestattet mit Ringen und Sender begab er sich anschliessend in die Region Leukerbad, wo er sich über mehr als einen Monat aufhielt, bevor er ebenfalls in die Region am Rhoneknie wechselte. Dieser besonders neugierige Vogel fiel wiederholt durch sehr nahe Annäherungen auf und landete teilweise nur wenige Meter vor den Beobachtenden.

Schlussfolgerung

Die Brutsaison 2025 bestätigt sowohl die Stabilität des reproduktiven Kerns der Bartgeier in der Westschweiz als auch die anhaltende Fragilität dieser Population, die sich noch in der Wachstumsphase befindet. Eine geringe Zunahme der Sterblichkeit bei den fortpflanzungsfähigen Erwachsenen könnte den in den letzten Jahren beobachteten positiven Trend umkehren (Schaub et al. 2024). Mit mindestens zwei verschwundenen brütenden Weibchen im Jahr 2025 dürfte man diesem Punkt wahrscheinlich nahe sein. Die Fortpflanzungsergebnisse liegen im Kontinuum der in den letzten Jahren beobachteten guten Leistungen, zeigen jedoch eine geringe Produktivität (58 %) im Vergleich zum Alpen-Durchschnitt (70 %). Die gesammelten Daten unterstreichen die entscheidende Bedeutung eines koordinierten und standardisierten Monitorings, das nicht nur eine präzise Dokumentation der Fortpflanzung ermöglicht, sondern auch Faktoren identifiziert, die deren Erfolg beeinflussen können.

Die im Jahr 2025 beobachteten Brutmisserfolge illustrieren die Komplexität der zugrunde liegenden Ursachen. Natürliche Bedingungen, die soziale Dynamik der Paare, Alter und Erfahrung der Individuen sowie anthropogene Einflüsse, die teils schwer zu quantifizieren, aber deutlich vorhanden sind, können sich miteinander vermischen. Die unterschiedlichen Ergebnisse gehen einher mit starkem menschlichem Druck, der zahlreiche Störungen an den Nestern verursacht. Die wiederholten Störungssituationen an vielen Nestern verdeutlichen die Notwendigkeit, zusätzlich zum biologischen Monitoring auch Präventions-, Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen zu verstärken. Die Zunahme der Paare in Ansiedlung und die Präsenz potenziell brütender Vögel in allen Gebieten der Region zeugen aber dennoch von einer positiven räumlichen Dynamik. ■

Célestin Luisier, Bartgeier-Netzwerk Westschweiz

Les moments forts du Réseau Chauves-souris en 2025

En 2025, le Réseau Chauves-souris Valais (RCVS) comptait 49 membres actifs, consolidant une équipe engagée sur l'ensemble du canton. Cette stabilité permet d'assurer la continuité des suivis de terrain, des expertises et des actions de sensibilisation, essentielles pour assurer la protection des populations valaisannes de chiroptères.

Gîtes d'importance nationale en Valais

Plusieurs colonies d'importance nationale font l'objet d'un suivi régulier par le RCVS. Ces gîtes regroupent souvent des colonies d'espèces rares en Suisse, donc prioritaires en termes de conservation. Nous traitons ici de quatre colonies, à titre d'exemple. La colonie de Grand Murin *(Myotis myotis)* de la grotte de la Crête de Vaas, installée en milieu souterrain depuis maintenant plusieurs années, semblait atteindre plusieurs centaines d'individus en fin d'été (nombres de chiroptères à l'envol vespéral), mais la méthode de comptage doit encore être validée (Fig. 1). Il s'agirait d'un nouveau record pour le site et de la colonie la plus peuplée du Valais, toutes espèces confondues, confirmant l'importance majeure de ce site pour les Murins.

La deuxième colonie est celle de la chapelle St-Sylve, à Vex, abritant le Grand fer-à-cheval *(Rhinolophus ferrumequinum)*, colonie historique suivie depuis plusieurs décennies. Elle présente une dynamique stable et des effectifs actuellement parmi les plus élevés observés (Fig 2), illustrant l'efficacité des mesures de protection mises en place depuis la fin des années 1980. La troisième colonie concerne le Rhinolophe Petit Fer-à-cheval *(Rhinolophus hipposideros)* de l'église du Châble, qui a atteint 25 adultes en 2025, confirmant une évolution positive des effectifs (Fig. 3). Les mesures de limitation de l'éclairage public semblent contribuer positivement à la dynamique de cette petite population.




Fig. 1: *Evolution des effectifs de «Grand Murin» (Myotis myotis ou M. blythii) de la colonie de la grotte de la Crête de Vaas. En noir, sont représentés les adultes (comptage de début d'été) tandis qu'en orange sont indiqués les jeunes de l'année (comptabilisés certaines années directement en inspectant le plafond de la cavité). En 2025, les adultes et les jeunes ont été regroupés car il n'y a eu qu'un comptage relativement tardif.*

Abb. 1: *Bestandsentwicklung der Kolonie in der Grotte von Vaas. Schwarz sind die erwachsenen Tiere dargestellt (Zählung zu Beginn des Sommers), während die Jungtiere des Jahres orange dargestellt sind (die in manchen Jahren direkt durch Inspektion der Decke der Höhle gezählt werden). 2025 wurden adulte Tiere und Jungtiere zusammen erfasst, da die erste Zählung erst realtiv spät im Jahr erfolgte.*




Fig. 2: *Evolution des effectifs de Grand Rhinolophe de la colonie de Vex, connue depuis 1973 et suivie depuis plus de 30 ans. En noir sont représentés les adultes, et en orange les jeunes de l'année.*

Abb. 2: *Entwicklung der Bestandszahlen der Kolonie von Grossen Hufeisennase in Vex, die seit 1973 bekannt ist und seit mehr als 30 Jahren überwacht wird. Schwarz sind die erwachsenen Tiere dargestellt, orange die Jungtiere des Jahres.*

Die Höhepunkte des Fledermaus-Netzwerks im Jahr 2025

Im Jahr 2025 zählte der Verein Fledermausschutz Wallis (RCVS) 49 aktive Mitglieder, die ein engagiertes Team bilden, das im gesamten Kanton tätig ist. Diese Stabilität ermöglicht die kontinuierliche Weiterführung von Felderhebungen, Fachbeurteilungen und Sensibilisierungsmassnahmen der Walliser Fledermauspopulationen.

Fledermauskolonien von nationaler Bedeutung

Mehrere Walliser Fledermauskolonien werden regelmässig überwacht. Die vom Fledermausnetzwerk Wallis (RCVS) betreuten Gebiete von nationaler Bedeutung umfassen Kolonien von seltenen, sogenannten prioritären Arten. Wir befassen uns hier beispielhaft mit vier Kolonien.

Die erste ist die Kolonie von Grossen Mausohren *(Myotis myotis)* in der Grotte von Vaas. Die Kolonie, die sich seit nunmehr mehreren Jahren unterirdisch angesiedelt hat, schien gegen Ende des Sommers mehrere hundert Individuen zu umfassen (Anzahl der Fledermäuse beim abendlichen Ausflug), doch die Zählmethode muss noch überprüft werden (Abb. 1). Dies wäre ein neuer Rekord für diesen Standort und die grösste Fledermaus-Kolonie im Wallis, was die grosse Bedeutung dieses Standorts zeigt.

Die zweite Kolonie befindet sich in der Kapelle St-Sylve in Vex, wo eine historische Kolonie von Grossen Hufeisennasen *(Rhinolophus ferrumequinum)* lebt, die seit mehreren Jahrzehnten beobachtet wird. Sie weist eine stabile Entwicklung auf und gehört derzeit zu den Kolonien mit den höchsten Bestandszahlen (Abb. 2), was die Wirksamkeit der seit Ende der 1980er-Jahre ergriffenen Schutzmassnahmen verdeutlicht. Die dritte Kolonie betrifft Kleine Hufeisennasen *(Rhinolophus hipposideros)* in der Kirche von Le Châble, deren Bestand im Jahr 2025 25 erwachsene Tiere erreichte, was eine positive Entwicklung bestätigt (Abb. 3). Die Massnahmen zur Reduktion der Strassenbeleuchtung scheinen positiv zur Dynamik dieser kleinen Population beizutragen.

Die vierte Kolonie befindet im Dachgeschoss der Kirche von Naters. Hier leben Grosse und Kleine Mausohren *(Myotis myotis* und *M. blythii)*. Dieser Kolonie wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da die Beleuchtung des Glockenturms die Nutzung des Standorts durch die Fledermäuse negativ beeinflusst. Die Beobachtungen zeigen, dass die Fledermäuse in ihrem abendlichen Ausflug beeinträchtigt werden, wenn die Beleuchtung in Betrieb ist, da das relativ starke Licht den Ausflug verzögert. Das RCVS hat ein Projekt initiiert, das auf eine Beleuchtungssteuerung abzielt, die auf die Fledermäuse Rücksicht nimmt (über dieses Projekt werden wir in einem späteren Bulletin berichten).

Massnahmen zugunsten der Bechsteinfledermaus

Um das Überleben der Bechsteinfledermaus *(Myotis bechsteinii)*, einer spezialisierten Waldart, im Walliser Chablais zu sichern, hat das RCVS im Jahr 2025 insgesamt 55 Nistkästen in Gehölzen der Region Les Barges angebracht. Diese Massnahme zielt darauf ab, das Angebot an Nistplätzen in Bäumen zu erweitern. Durch eine jährliche Überwachung lässt sich die Wirksamkeit dieser Massnahme langfristig überprüfen.




Fig. 3: *Evolution des effectifs de Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) de la colonie du Châble. En noir sont représentés les adultes, et en orange les jeunes de l'année. Entre 2006 et 2021 les jeunes ont été inventoriés séparément des adultes.*

Abb. 3: *Entwicklung der Bestandszahlen der Kolonie von Kleinen Hufeisennasen von Châble. Schwarz sind die erwachsenen Tiere dargestellt, orange die Jungtiere des Jahres. In einigen Jahren wurden die Jungtiere nicht separat gezählt.*



Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Grosse Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum).

Enfin, la quatrième colonie est celle abritant des Grands et Petits Murins *(Myotis myotis* et *M. blythii)* dans les combles de l'église de Naters. Cette colonie a fait l'objet d'une attention particulière en raison de l'influence négative de l'éclairage du clocher sur la fréquentation du site par les chiroptères. Les observations montrent que les chauves-souris sont affectées dans leur envol vespéral lorsque les éclairages sont en opération, la lumière assez forte retardant les sorties. Le RCVS a initié un projet visant une gestion de l'éclairage qui tienne compte des murins (un article spécifique sera consacré à ce projet).

Mesures en faveur du Murin de Bechstein

Afin de favoriser la présence du Murin de Bechstein *(Myotis bechsteinii)*, une espèce forestière spécialisée, dans le Chablais valaisan, le RCVS a mis en place en 2025 un total de 55 nichoirs dans les bosquets de la région des Barges. Ce dispositif vise à renforcer l'offre en gîtes arboricoles. Un suivi annuel permettra d'évaluer l'efficacité de cette mesure sur le long terme.

Inventaire cantonal du patrimoine bâti favorable aux chauves-souris

En 2025, le RCVS a également initié un nouveau projet d'inventaire du bâti à l'échelle cantonale. Il s'agit d'actualiser l'inventaire des sites valaisans abritant les chauves-souris qui avait été publié par le RCVS en 1993. Le but est de revisiter l'ensemble des bâtiments ayant historiquement accueilli des colonies de chauves-souris dans le canton, dans un contexte où plusieurs d'entre elles semblent avoir disparu ou s'être déplacées suite à des transformations (rénovation des combles et clochers, fermeture inopinée des voies d'accès, éclairages nocturnes, etc.). Cet inventaire revisité permettra non seulement d'identifier les sites encore occupés ou potentiellement favorables, par comparaison avec la situation des années 1980-1990, mais également de planifier des interventions ciblées. En effet, les bâtiments visités font, lorsque cela est nécessaire, l'objet de propositions d'aménagements favorables aux chauves-souris, notamment en termes d'accès et de conditions thermiques. L'objectif est double: favoriser le retour de colonies disparues et augmenter l'offre en gîtes aussi propices que possible. Le projet est mené par l'ensemble de nos membres actifs.

InfoBat et Swissbat

Le RCVS s'inscrit dans une structure nationale de coordination des données et des actions en faveur des chauves-souris. Jusqu'à présent, le Centre de coordination ouest (CCO, Genève) et la Koordinationsstelle für Fledermausschutz (KOF, Zurich) assuraient respectivement la coordination des régions romande et alémanique. Afin de renforcer l'uniformisation des pratiques et la cohérence à l'échelle nationale, une évolution structurelle majeure a été engagée. En 2026, les deux entités ont fusionné pour former InfoBat. Dans ce même contexte de transition, l'année 2025 a marqué une étape importante avec la migration des données du RCVS vers la plateforme nationale Swissbat, qui deviendra pleinement opérationnelle dès 2026. Cette transition permet une harmonisation des données à l'échelle suisse et une valorisation accrue des observations. Swissbat constitue la première base de données nationale centralisée dédiée aux chauves-souris en Suisse. Elle regroupe les données issues des structures régionales et du Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), et représente une avancée majeure pour la gestion, l'analyse et la diffusion des données chiroptérologiques.

Prospections et soirées de capture en 2025

Malgré le nombre important d'expertises et de projets menés en 2025, le RCVS a réussi à maintenir une forte activité sur le terrain, notamment à travers des prospections et des soirées de capture ciblées sur des sites revêtant un intérêt potentiel pour les chauves-souris. L'une des soirées marquantes de l'année a été une séance de capture au filet à l'entrée du lac souterrain de Saint-Léonard, réunissant des chiroptérologues issus de plusieurs cantons (Fig. 4). Ces échanges intercantonaux permettent de renforcer les pratiques de terrain, d'échanger sur les méthodes de suivi et d'améliorer la connaissance des espèces, notamment des chauves-souris méridionales que le Valais a la chance d'abriter.

Activités de sensibilisation et de formation

Par ailleurs, le RCVS a poursuivi ses activités de sensibilisation et de formation tout au long de la saison estivale. Les membres ont régulièrement partagé leur expertise et leur passion à travers des animations et des formations destinées à différents publics. La Nuit des chauves-souris a une nouvelle fois rencontré un large succès, tant dans le Valais romand qu'en Haut-Valais, confirmant l'intérêt constant du public pour ces mammifères nocturnes, leur écologie et leur protection.

Remerciements

Nous remercions chaleureusement pour leur soutien le Service des forêts, de la nature et du paysage, le Parc naturel du Trient ainsi que la Fondation Jelling (Forring), qui financent et soutiennent nos projets. Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble des membres du RCVS pour leur engagement, leur travail et leur contribution essentielle aux activités de terrain, de suivi et de sensibilisation. ■

Anouk Lettman, Réseau Chauves-souris Valais

Kantonales Inventar von fledermausfreundlichen Gebäuden und Bauten

2025 hat das RCVS ein neues Projekt zur kantonweiten Bestandsaufnahme von Gebäuden ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, das vom RCVS 1993 veröffentlichte Verzeichnis der Walliser Standorte, an denen Fledermäuse leben, zu aktualisieren. Ziel ist es, alle Gebäude im Kanton erneut zu untersuchen, in denen in der Vergangenheit Fledermauskolonien lebten. Viele dieser Kolonien sind offenbar verschwunden oder haben sich infolge von Umbauten (Renovierung von Dachböden und Kirchtürmen, unerwartete Sperrung von Zugangswegen, nächtliche Beleuchtung usw.) verlagert. Das aktualisierte Inventar wird es nicht nur ermöglichen, im Vergleich zur Situation der 1980er- und 1990er-Jahre noch besiedelte oder potenziell geeignete Standorte zu identifizieren, sondern auch gezielte Massnahmen zu planen. Denn für die besichtigten Gebäude werden, sofern erforderlich, Vorschläge für fledermausfreundliche Umgestaltungen gemacht, insbesondere hinsichtlich des Zugangs und der thermischen Bedingungen. Das Inventar hat zwei Ziele: die Rückkehr verschwundener Kolonien zu fördern und das Angebot an möglichst geeigneten Quartieren zu vergrössern. Das Projekt wird von unseren aktiven Mitgliedern durchgeführt.

InfoBat und Swissbat

Der Verein Fledermausschutz Wallis ist in eine nationale Struktur für Daten und Massnahmen zugunsten der Fledermäuse eingebunden. Bis anhin stellten das Centre de coordination ouest (CCO) und die Koordinationsstelle für Fledermausschutz (KOF) in Zürich die Koordination für die Westschweiz beziehungsweise die Deutschschweiz sicher. Um die Vereinheitlichung der Arbeitsweisen auf nationaler Ebene zu stärken, wurden die beiden Einrichtungen 2026 zu InfoBat zusammengeführt. Dabei stellte 2025 einen wichtigen Übergang dar: Die Daten des RCVS werden auf die nationale Plattform Swissbat übertragen, die ab 2026 vollständig einsatzbereit sein wird. Diese Umstellung ermöglicht eine Harmonisierung der Daten auf gesamtschweizerischer Ebene und eine bessere Verfügbarkeit der Beobachtungen. Swissbat ist die erste zentralisierte nationale Datenbank der Schweiz für Fledermäuse. Sie vereint Daten aus den regionalen Strukturen sowie aus dem Schweizerischen Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF) und stellt einen wichtigen Fortschritt für die Verwaltung, Analyse und Verbreitung von Fledermaus-Daten dar.

Erhebungen und Fangabende im Jahr 2025

Trotz der grossen Anzahl an Gutachten und Projekten, die 2025 durchgeführt wurden, gelang es dem RCVS, seine Aktivitäten vor Ort auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten, insbesondere durch Beobachtungen und gezielte Fangaktionen an Standorten, die für Fledermäuse von potenziellem Interesse sind. Einer der Höhepunkte des Jahres war eine Fangaktion mit Netzen am Eingang des unterirdischen Sees von Saint-Léonard, an der Chiropterologen aus mehreren Kantonen teilnahmen (Abb. 4). Dieser kantonsübergreifende Austausch trägt dazu bei, die Praktiken vor Ort zu verbessern, sich über Überwachungsmethoden auszutauschen und das Wissen über die Arten zu vertiefen, insbesondere über die südlichen Fledermausarten, die im Wallis heimisch sind.

Sensibilisierung und Nacht der Fledermäuse

Während der gesamten Sommersaison führte der Verein Fledermausschutz Wallis Sensibilisierungs- und Ausbildungsaktivitäten durch. Die Mitglieder gaben ihr Fachwissen und ihre Begeisterung regelmässig im Rahmen von Veranstaltungen und Schulungen für unterschiedliche Zielgruppen weiter. Die Nacht der Fledermäuse war erneut ein grosser Erfolg – sowohl im Unterwallis als auch im Oberwallis. Dies bestätigt das Interesse der Bevölkerung an diesen nachtaktiven Säugetieren, ihrer Ökologie und ihrem Schutz.

Dank

Wir danken herzlich der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft (DWFL) des Kantons Wallis, dem Naturpark Trient sowie der Fondation Jelling (Forring) für ihre finanzielle Unterstützung und die Förderung unserer Projekte. Unser Dank gilt ebenfalls allen Mitgliedern des Vereins für ihr Engagement, ihre Arbeit und ihren wichtigen Beitrag zu den Feldarbeiten, den Monitoringaktivitäten und den Sensibilisierungsmassnahmen. ■

Anouk Lettmann
Fledermausnetzwerk Wallis



Fig. 4: *Montage des filets et détermination au Lac souterrain de St-Léonard.*

Abb. 4: *Aufbau der Netze und Bestimmung am unterirdischen See von St-Léonard.*

Le lynx en Valais: la régulation officielle supplantera-t-elle la longue tradition de régulation illégale?

Voilà en bref ce que la presse nous a récemment annoncé à grands fracas, sous la plume de Sven Papaux.[1, 2] Le journaliste y fait le point sur la situation du lynx en Valais, rappelant notamment le braconnage rampant et systématique dont il a été et est toujours victime dans le canton. Ces papiers ont soulevé l'ire du président de la Fédération valaisanne des sociétés de chasse, James Derivaz[3]. Tant de mauvaise foi dans sa prise de position radiophonique consterne quand l'on sait l'hypocrisie sous-jacente.[4]

Alors, prenons un peu de hauteur et revenons sur les faits!

Durant quatre décennies (des années 1980 au milieu des années 2010), le lynx a subi une pression de braconnage forcenée en Valais, tant par les armes à feu que par le piégeage (pièges à collet, pièges-trappes et même pièges à mâchoire). Cette chasse illégale a diminué à la fin des années 2010 et au début des années 2020, lorsque mon groupe de recherche à l'Université de Berne a démontré la supercherie des opérations de braconnage de grande ampleur menées au Coude du Rhône et dénoncé le cas au Ministère public valaisan: nous avions mis à jour l'existence de 17 systèmes de pièges étrangleurs sur seulement 4 km^2, dans le principal corridor d'entrée en Valais pour les lynx vivant plus au Nord. Tout cela a fait l'objet d'une publication scientifique en anglais validée par les pairs[5]. Nos résultats ont été repris dans la foulée par tous les médias du pays et même à l'internationale. Peu après ces macabres découvertes, le Valais vivait des changements au niveau de la gouvernance étatique qui ont contribué à un certain glissement de paradigme au sein de nos autorités. Ce qui était resté longtemps impuni a enfin commencé à être poursuivi.

Cette persécution systématique du lynx, des décennies durant, était une activité institutionnalisée puisque des gardes-chasse, soit des agents assermentés de l'Etat, y ont contribué (certains sont toujours en service), en plus de chasseurs mal intentionnés, tandis que des forces de police ont exercé des pressions sur les rares personnes qui osaient dénoncer ces actes délictueux. Longtemps la loi du silence, l'omerta, a régné en maîtresse dans une ambiance d'hypocrisie crasse. On y a mis progressivement fin entre 2015 et 2021…

Mais nous ne méprenons pas, s'il a probablement diminué, le braconnage du lynx est toujours d'actualité dans le canton. On notera trois cas enfin dénoncés par le Service chasse, pêche et faune (SCPF nouvelle mouture) en 2021 (dont deux lynx tirés par des armes de chasse), tous trois instruits par la justice, mais sans condamnation à la clef faute de coupable identifié. Alors qu'en plus de 40 ans, aucun cas de braconnage n'avait officiellement été reconnu sous les ères Seppey et Scheibler, tout d'un coup, en une année, la vérité apparaissait au grand jour, sous la houlette du conseiller d'État Frédéric Favre et du chef de service Nicolas Bourquin... Notons que depuis 2021 plus aucune dénonciation n'a été officiellement annoncée. Serait-ce que le braconnage du lynx a cessé? Pas vraiment: deux cas probants récents nous sont connus. L'un des deux cas est décrit en pages 10-13 du présent bulletin.

Mon équipe à l'Université de Berne dispose des informations les plus actuelles et fiables sur l'évolution des effectifs de lynx en Valais. En effet, si le canton du Valais confie au KORA la tâche d'effectuer le suivi du lynx dans le canton, ce dernier ne livre aucune estimation d'effectif sur une base cantonale. Ainsi, les statistiques que l'on nous avance en haut lieu, notamment de la bouche du président de notre Gouvernement valaisan, sur le nombre et la densité de lynx dans le Nord du Valais reflètent en fait ce qui se passe sur un vaste périmètre de suivi qui comprend non seulement le nord-ouest du Valais mais également les Alpes vaudoises et une partie des Alpes bernoises. De plus, le KORA n'opère jamais un suivi sur l'ensemble du territoire cantonal au cours d'une seule et même année, contrairement à ce que nous effectuons avec mon team. Nos pièges-photo déployés sur tout le territoire cantonal depuis 2011 ont montré que la population du lynx dans le canton a stagné autour de 5 à 8 lynx indépendants entre 2010 et 2018, avec deux seuls cas de reproduction en tout

1 www.watson.ch/fr/suisse/politique/362322435-valais-un-tir-de-regulation-du-lynx-serait-en-discussion
2 www.watson.ch/fr/suisse/animaux/258718964-le-retour-du-lynx-en-valais-revele-des-zones-d-ombre
3 Rappelons que James Derivaz a été condamné pénalement pour activité de chasse illégale au début des années 2000; il est quand même étrange que la Fédération valaisanne des sociétés de chasse se soit dotée d'un président au passé de braconnier. Notons également que ce même James Derivaz est directeur de DranseEnergie, propriétaire du lac artificiel des Toules, qui avait éradiqué la biodiversité de la Dranse lors d'une purge massive non conforme du barrage hydroélectrique en mars 2024 (voir faunaVS info No 45: pages 14-15).
4 www.rhonefm.ch/valais/baisse-du-nombre-de-chevreuils-et-chamois-due-au-lynx-en-valais-le-canton-analyse-la-situation-1587368
5 Arlettaz, R., G. Chapron, M. Kéry, E. Klaus, S. Mettaz, S. Roder, S. Vignali, F. Zimmermann & V. Braunisch (2021). Poaching threatens the establishment of a lynx population, highlighting the need of a centralized judiciary approach. Frontiers in Conservation Science. DOI 10.3389/fcosc.2021.665000

Der Luchs im Wallis: Wird die offizielle Bestandsregulierung die lange Tradition der illegalen Regulierung ablösen?

Das ist, kurz gesagt, was uns die Medien kürzlich mit grossem Aufsehen verkündet haben.[1, 2] Der Journalist Sven Papaux gibt einen Überblick über die Situation des Luchses im Wallis und verweist auch auf die grassierende und systematische Wilderei, der diese Tierart im Kanton zum Opfer fiel und weiterhin zum Opfer fällt. Die Artikel haben den Zorn des Präsidenten des Walliser Jagdverbands, James Derivaz[3], geweckt. So viel Unaufrichtigkeit in seiner Stellungnahme im Radio ist bestürzend, wenn man die Geschichte dahinter kennt.[4]

Lassen Sie uns doch einen Schritt zurücktreten und noch einmal die Fakten betrachten!

Vier Jahrzehnte lang (von den 1980er-Jahren bis Mitte der 2010er-Jahre) war der Luchs im Wallis einem massiven Wildereidruck ausgesetzt, sowohl durch Schusswaffen als auch durch Fallen (Schlingen, Fallgruben und sogar Backenfallen). Diese illegale Jagd ging Ende der 2010er- und Anfang der 2020er-Jahre zurück, als meine Forschungsgruppe an der Universität Bern die gross angelegten Wildereiaktionen am Rhoneknie aufdeckte und den Fall bei der Walliser Staatsanwaltschaft anzeigte: Wir deckten die Existenz eines Systems von 17 Schlingenfallen auf einer Fläche von nur 4 km^2 auf, und zwar im wichtigsten Einwanderungskorridor ins Wallis für weiter nördlich lebende Luchse. All dies war Gegenstand einer wissenschaftlichen, von Fachkollegen begutachteten Veröffentlichung in englischer Sprache[5]. Unsere Ergebnisse wurden umgehend von allen Medien des Landes und sogar international aufgegriffen. Kurz nach diesen makabren Entdeckungen kam es im Wallis zu Veränderungen in der staatlichen Führung, die zu einem gewissen Paradigmenwechsel innerhalb unserer Behörden beitrugen. Was lange Zeit ungestraft geblieben war, wurde endlich strafrechtlich verfolgt.

Die jahrzehntelange systematische Verfolgung des Luchses war eine institutionalisierte Praxis, da neben böswilligen Jägern auch Wildhüter – also vereidigte Staatsbedienstete (von denen einige noch immer im Dienst sind) – daran mitwirkten, während die Polizei Druck auf die wenigen Personen ausübte, die es wagten, diese Straftaten anzuzeigen. Lange Zeit herrschte das Gesetz des Schweigens, die «Omerta», in einer Atmosphäre krasser Heuchelei. Zwischen 2015 und 2021 wurde dem schrittweise ein Ende gesetzt…

Doch wir machen uns keine Illusionen: Auch wenn sie wahrscheinlich zurückgegangen ist, ist die Wilderei auf Luchse im Kanton nach wie vor ein aktuelles Problem. Zu vermerken sind drei Fälle, die 2021 von der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW in ihrer neuen Form) angezeigt wurden (darunter zwei mit Jagdwaffen erschossene Luchse); alle drei wurden gerichtlich untersucht, führten jedoch mangels identifizierter Täter zu keiner Verurteilung. Während in über 40 Jahren unter den Amtszeiten der Herren Seppey und Scheibler kein einziger Fall von Wilderei offiziell anerkannt worden war, kam plötzlich innerhalb eines Jahres unter der Leitung von Staatsrat Frédéric Favre und Dienststellenchef Nicolas Bourquin die Wahrheit ans Licht… Es sei angemerkt, dass seit 2021 offiziell keine Anzeige mehr erstattet wurde. Dies, weil die Luchswilderei aufgehört hat? Nicht wirklich: Uns sind zwei aktuelle, eindeutige Fälle bekannt. Einer der beiden Fälle wird im vorliegenden Bulletin auf Seiten 10-13 beschrieben.

Mein Team an der Universität Bern verfügt über die aktuellsten und zuverlässigsten Informationen zur Entwicklung der Luchsbestände im Wallis. Denn obwohl der Kanton Wallis KORA mit der Überwachung des Luchses im Kanton beauftragt hat, liefert KORA keine Bestandsschätzungen auf kantonaler Ebene. Die Statistiken, die uns von höchster Stelle – insbesondere vom Präsidenten unserer Walliser Regierung – zur Anzahl und Dichte der Luchse im Nordwallis vorgelegt werden, spiegeln also die Situation in einem weitläufigen Überwachungsgebiet wider, das nicht nur den Nordwesten des Wallis, sondern auch die Waadtländer Alpen und einen Teil der Berner Alpen umfasst. Zudem führt KORA im Gegensatz zu dem, was mein Team und ich tun, niemals im Laufe eines einzigen Jahres eine Bestandserhebung im gesamten Kantonsgebiet durch. Unsere seit 2011 im gesamten Kantonsgebiet aufgestellten Fotofallen haben gezeigt, dass die Luchspopulation im Kanton zwischen 2010 und 2018 bei etwa fünf bis acht unabhängigen Luchsen stagnierte, wobei es insgesamt nur zwei Fortpflanzungsfälle gab, und zwar 2014 und 2017. In diesem Jahrzehnt waren die Luchse fast ausschliesslich auf den Bereich nördlich der Rhone beschränkt, eine Region, die – infolge von Verlusten, die hauptsächlich auf Wilderei zurückzuführen waren – regelmässig von Luchsen wiederbesiedelt wurde, die aus den Waadtländer und Berner Alpen auswanderten, wo ihre Bestandsdichte normal war. Das Gebiet südlich der Rhone

3 Zur Erinnerung: James Derivaz war Anfang der 2000er-Jahre wegen illegaler Jagd verurteilt wurde. Der Walliser Verband der Jagdvereine hat sich also einen Präsidenten mit einer Vergangenheit als Wilderer gegeben. Derselbe James Derivaz ist auch Geschäftsführer von DranseEnergie, Eigentümerin des Stausees Les Toules, der im März 2024 bei einer vorschriftswidrigen Entleerung des Sees die Tierwelt der Dranse ausgelöscht hatte (siehe faunavs info Nr. 45: Seiten 14–15).

et pour tout, en 2014 et 2017. Durant cette décennie-là, les lynx étaient quasi exclusivement cantonnés au nord du Rhône, région régulièrement recolonisée – suite aux pertes dues principalement au braconnage – par des lynx dispersant à partir des Alpes vaudoises et bernoises où leur densité était normale. La région au Sud du Rhône (Alpes pennines) avait été quasiment vidée de ses lynx entre les années 1990 et 2015, alors que l'espèce y était encore bien présente dans les années 1980 (plusieurs individus suivis par radiopistage par Heinrich Haller, ancien directeur du Parc National suisse, entre le Binntal et la Printze). En d'autres termes, à la fin des années 2010, le lynx était au bord de l'extinction en Valais, conséquence du braconnage qui y a sévi en toute impunité, avec un feint désintérêt sinon le soutien des autorités d'avant 2021, sans oublier l'implication directe d'agents étatiques.

Depuis le début des années 2020, l'espèce reprend du poil de la bête, suite à la condamnation pénale de ce fameux chasseur de Dorénaz dont nous avions démontré les agissements délictueux, le poseur des fameux pièges éjecteurs-étrangleurs et d'autres types de trappes. Largement médiatisée, cette affaire a entraîné une baisse du braconnage car ce qui était longtemps resté cryptique émergeait enfin en pleine lumière. La réponse des lynx ne s'est pas faite attendre: en 2025, on comptait une trentaine de lynx indépendants (adultes) sur l'ensemble du territoire valaisan. A quoi il faut rajouter au moins 11 jeunes, encore dépendants de leur mère, issus de 8 portées. La densité augmentant progressivement au nord du Rhône, les lynx se sont mis à recoloniser, par dispersion, le sud du Rhône, surtout dès l'hiver 2024-2025. C'est ainsi que les lynx s'autorégulent pour ne pas se concurrencer localement au niveau des proies: ils dispersent et s'installent sur de nouveaux territoires vacants. Cette expansion et recolonisation des bastions méridionaux d'où il avait récemment été éradiqué (pour la seconde fois en quelques siècles) et où le potentiel d'habitabilité est grand, est appelée à se poursuivre, mais tout dépendra de l'ampleur des abattages, légaux ou illégaux.

En catimini, les milieux de la chasse et les instances officielles en charge de la gestion de la faune sauvage préparent donc depuis un certain déjà, si l'on en croit le média Watson, des interventions auprès de la Confédération afin de bientôt tenter d'officialiser la régulation du lynx dans le canton. Avec l'entrée par la petite porte (forçage au sein des chambres fédérales des éléments de la loi pourtant refusée par le peuple suisse suite au référendum de 2020) de la nouvelle loi sur la chasse et le protection des oiseaux et des mammifères sauvages, je n'ai cessé d'annoncer l'imminence d'une telle tentative, depuis 2023... Je ne suis pas sûr que l'on m'ait pris au sérieux! Or, la voici maintenant mise en oeuvre…

Mais que lui reproche-t-on dans le faits, au lynx? Des dommages aux animaux rente? Non, ceux-ci restent insignifiants, surtout si on les compare aux déprédations causées par le loup. La seule chose que l'on puisse reprocher au lynx est de se nourrir de chevreuils et de chamois, leur principales proies dans les Alpes. Cette attaque contre le lynx n'émane donc pas des éleveurs, mais des milieux de la chasse qui ont peur de voir leur loisir bousculé par le félin. Il faut dire que dans ces cercles on voit dans le lynx essentiellement un vil concurrent alors que ce n'est rien moins qu'un des principaux facteurs de co-évolution des communautés écologiques habitant nos montagnes depuis la nuit des temps (sauf un petit siècle d'absence entre son extermination vers la fin du 19e siècle et sa réintroduction à la fin du 20e).

La question sous-jacente est finalement de savoir à qui appartient la faune sauvage, en tant que patrimoine naturel. La société accorde aux chasseurs le droit d'exploiter cette ressource faunistique, mais elle ne leur appartient pas pour autant. La faune sauvage est un bien commun, public. On peut donc percevoir la volonté de réguler cette espèce comme un réflexe égoïste, consistant à ne pas vouloir partager avec le lynx les proies convoitées pour une pure activité de loisir, et à ne pas vouloir partager avec le grand public le plaisir de savoir cet animal emblématique évoluer dans nos forêts, avec parfois la chance de l'observer, une chance unique que beaucoup chérissent... et qui laisse un souvenir impérissable.

Mais ce qui est incroyable dans toute cette histoire, c'est que les chasseurs incriminent toujours les prédateurs lorsque leur tableau de chasse diminue, sans jamais remettre en question leur propre activité de nemrods, en particulier la nature et l'impact de leur prélèvement qui est aussi une forme de prédation. La recherche a pourtant démontré que l'exploitation de la faune sauvage par les grands prédateurs est plus durable que celle de la chasse par les humains, en tout cas en ce qui concerne la chasse moderne, technologiquement suréquipée, pratiquée principalement en Occident. En effet, la prédation par les carnivores joue avec deux mécanismes qui garantissent un impact minimal sur la démographie de leurs espèces proies: la mortalité compensatoire et la valeur reproductive. Ces deux notions sont malheureusement rarement comprises alors qu'elles sont essentielles; on pourrait insister sur ces mécanismes dans le cadre des cours distillés aux candidats chasseurs. A titre d'exemple, le nouveau plan de chasse au chamois mis en place depuis 2025 démontre à l'envi que ces notions soit sont absentes ou ignorées dans les réflexions des spécialistes chargés de la gestion de la faune sauvage, soit que nos éminents dirigeants politiques contournent impunément les propositions de gestion mises sur la table par les experts de leur propre administration. Résultat des courses: les stratégies de gestion sont basées sur des croyances en lieu et place de connaissances. Il serait urgent de se pencher sur les modalités de cette gestion cynégétique qui cause des dégâts (sic) considérables à nos populations de gibier. Le Valais devrait pour cela rapidement se doter d'un Service de conservation de la faune, comme c'est le cas dans bien d'autres cantons suisses. La focalisation traditionnelle des services de l'Etat du Valais sur la seule exploitation (bancale de surcroît) par la chasse n'est plus à la hauteur des enjeux modernes.

Via son programme lancé en 2011, mon équipe de recherche est le seul organe qui dispose d'une vision d'ensemble quantitative fiable, via des indicateurs éprouvés, de l'évolution de la faune des grands carnivores et des ongulés sauvages, ainsi que de leurs interactions, dans le canton. Les seuls tableaux de chasse annuels ne suffisent pas à cet égard, tandis que les comptages visuels du gibier devraient absolument être améliorés en tenant compte de la probabilité de détection, absente des relevés menés jusqu'ici. Les gestionnaires ont encore à apprendre des chercheurs, sans parler des dirigeants politiques! Malheureusement, on nous fait la sourde oreille.

war zwischen den 1990er-Jahren und 2015 fast vollständig von Luchsen entvölkert worden, während die Art dort in den 1980er-Jahren noch stark vertreten war (mehrere Exemplare wurden von Heinrich Haller, dem ehemaligen Direktor des Schweizer Nationalparks, zwischen dem Binntal und der Printze per Funkortung verfolgt). Mit anderen Worten: Ende der 2010er-Jahre stand der Luchs im Wallis kurz vor dem Aussterben – eine Folge der Wilderei, die dort ungestraft wütete, begleitet von vorgetäuschtem Desinteresse oder gar der Unterstützung durch die Behörden vor 2021, ganz zu schweigen von der direkten Verwicklung staatlicher Bediensteter.

Seit Anfang der 2020er-Jahre erholt sich die Art wieder, nachdem der berühmt-berüchtige Jäger aus Dorénaz, dessen kriminelle Machenschaften wir aufgedeckt hatten – derjenige, der die Schlingenfallen sowie andere Arten von Fallen aufgestellt hatte –, strafrechtlich verurteilt wurde. Dieser in den Medien stark beachtete Fall führte zu einem Rückgang der Wilderei, da das, was lange Zeit im Verborgenen geblieben war, endlich ans Tageslicht kam. Die Reaktion der Luchse liess nicht lange auf sich warten: Im Jahr 2025 zählte man im gesamten Wallis etwa 30 unabhängige (erwachsene) Luchse. Hinzu kamen mindestens elf Jungtiere aus acht Würfen, die noch von ihrer Mutter abhängig waren. Da die Populationsdichte nördlich der Rhone allmählich zunahm, begannen die Luchse, vor allem ab dem Winter 2024/25, auch den Süden der Rhone wieder zu besiedeln. So regulieren sich die Luchse selbst, um sich lokal nicht um Beute zu konkurrieren: Sie breiten sich aus und lassen sich in neuen, unbesetzten Revieren nieder. Diese Ausbreitung und Wiederbesiedlung der südlichen Hochburgen, aus denen er kürzlich (zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahrhunderte) ausgerottet worden war und in denen das Lebensraumpotenzial gross ist, wird sich fortsetzen, doch alles hängt vom Ausmass der legalen oder illegalen Abschüsse ab.

Hinter den Kulissen bereiten die Jagdkreise und die für das Wildtiermanagement zuständigen Behörden, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, bereits seit einiger Zeit Vorstösse beim Bund vor, mit dem Ziel, die Regulierung des Luchsbestands im Kanton offiziell zu erlauben. Mit der Einführen des neuen Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel quasi durch die Hintertür (Durchsetzung von Teilen des Gesetzes im eidg. Parlament, obwohl dieses vom Schweizer Volk infolge des Referendums von 2020 abgelehnt worden war) habe ich seit 2023 immer wieder auf die bevorstehende Einleitung eines solchen Vorhabens hingewiesen... Ich bin mir nicht sicher, ob man mich ernst genommen hat! Nun wird es jedoch umgesetzt…

Aber was wirft man dem Luchs eigentlich vor? Schäden an Nutztieren? Nein, diese sind marginal. Das Einzige, was man dem Luchs vorwerfen kann, ist, dass er sich von Rehen und Gämsen ernährt, seiner Hauptbeute in den Alpen. Dieser Angriff auf den Luchs geht also nicht von den Viehzüchtern aus, sondern von den Jagdkreisen, die befürchten, dass ihr Freizeitvergnügen durch die Raubkatze beeinträchtigt wird. Man muss sagen, dass man in diesen Kreisen den Luchs im Wesentlichen als bösartigen Konkurrenten betrachtet, obwohl er nichts Geringeres ist als einer der wichtigsten Faktoren für die Koevolution der ökologischen Gemeinschaften, die seit Urzeiten in unseren Bergen leben (abgesehen von einem kurzen Jahrhundert der Abwesenheit zwischen seiner Ausrottung gegen Ende des 19. Jh. und seiner Wiederansiedlung Ende des 20. Jh.). Die zugrunde liegende Frage ist letztlich, wem die Wildtiere gehören. Die Gesellschaft räumt den Jägern das Recht ein, diese Ressource zu nutzen, doch sie gehört ihnen deshalb noch lange nicht. Die Wildtiere sind ein gemeinsames, öffentliches Gut. Man kann den Willen, diese Art zu regulieren, daher als egoistischen Reflex wahrnehmen, der darin besteht, die begehrten Beutetiere nicht mit dem Luchs teilen zu wollen – nur um einer reinen Freizeitbeschäftigung nachzugehen – und die Freude nicht mit der breiten Öffentlichkeit teilen zu wollen, zu wissen, dass dieses symbolträchtige Tier in unseren Wäldern lebt, mit der gelegentlichen Chance, es zu beobachten – eine einzigartige Gelegenheit, die viele schätzen… und die eine unvergessliche Erinnerung hinterlässt.

Das Unglaubliche an dieser ganzen Geschichte ist aber, dass Jäger jeweils die Raubtiere beschuldigen, wenn ihre Jagdbeute zurückgeht, ohne jemals ihre eigene Tätigkeit in Frage zu stellen – vor allem die Art und die Auswirkungen der Jagd. Die Forschung hat gezeigt, dass die Nutzung der Wildtiere durch Grossraubtiere nachhaltiger ist, als wenn dies durch den Menschen geschiet, zumindest was die moderne, technologisch gut ausgestattete Jagd betrifft. Tatsächlich greift die Prädation durch Grossraubtiere auf zwei Mechanismen zurück, die eine minimale Auswirkung auf die Populationsdynamik ihrer Beutetiere haben: die kompensatorische Mortalität und den Reproduktionswert. Diese beiden Konzepte werden leider selten verstanden, obwohl sie von grosser Bedeutung sind (man könnte sie im Rahmen der Lehrgänge für angehende Jäger stärker hervorheben). So zeigt beispielsweise der seit 2025 geltende Jagdplan für Gämse nur allzu deutlich, dass diese Begriffe in den Überlegungen der für das Wildtiermanagement zuständigen Fachleute entweder fehlen oder ignoriert werden oder dass unsere hochrangigen politischen Entscheidungsträger die von den Experten ihrer eigenen Verwaltung vorgelegten Managementvorschläge einfach umgehen. Das Ergebnis: Die Bewirtschaftungsstrategien basieren auf Glaubenssätzen statt auf Wissen. Es wäre dringend notwendig, sich mit den Modalitäten einer Jagd auseinanderzusetzen, die unseren Wildbeständen erheblichen Schaden (sic) zufügt. Das Wallis sollte sich daher rasch mit einer Dienststelle für Wilderhaltung ausstatten, wie es in vielen anderen Schweizer Kantonen bereits der Fall ist. Die traditionelle Ausrichtung der staatlichen Stellen des Wallis, die sich ausschliesslich auf die (im Übrigen unzulängliche) Nutzung durch die Jagd konzentriert, wird den modernen Herausforderungen nicht mehr gerecht.

Mit dem 2011 gestarteten Programm ist mein Forschungsteam die einzige Stelle, die über einen zuverlässigen quantitativen Überblick über die Entwicklung der Populationen von Grossraubtieren und wildlebenden Huftieren sowie über deren Wechselwirkungen im Kanton verfügt. Die jährlichen Jagdstatistiken allein reichen hierfür nicht aus, während die Wildzählungen unbedingt verbessert werden müssten, indem die Erkennungswahrscheinlichkeit berücksichtigt wird. Die Verantwortlichen für die Wildbewirtschaftung müssen noch einiges von den Forschenden lernen, ganz zu schweigen von den politischen Entscheidungsträgern!

Avec mon équipe, nous sommes en train d'analyser la longue série temporelle de données accumulées en Valais depuis 2011 (260'000 clichés en moyenne par an). Nos résultats débouche-ront sur des recommandations pour une gestion plus durable de l'ensemble de la grande faune sauvage. Pas sûr toutefois que la politique s'en inspire car l'évidence scientifique, en matière de biodiversité, est encore malheureusement trop souvent étrangère aux prises de décisions par nos dirigeants. Les relations préda-teurs-proies sont des phénomènes complexes, donc difficiles à décrypter. Nous construisons la connaissance nécessaire, pas à pas. Notre espoir est que les acquis de la science finiront par être intégrés dans les stratégies développées par les agents de l'administration et les décisions prises par les dirigeants po-litiques. Il y a encore et toujours trop de discours émanant de simples croyances et, pire encore, de politiques empreintes de populisme. A terme, c'est une catastrophe pour une gestion du-rable de nos ressources naturelles, notre patrimoine faunistique y compris. Rappelons enfin que la science ce n'est pas que la simple observation du monde, tout quidam peut en effet se tar-guer d'observer la nature. La science c'est aussi et surtout la capacité d'interpréter correctement ce que l'on observe. Il faut cesser d'appréhender et de gérer la faune sauvage comme si nous étions de simples observateurs... ■

Raphaël Arlettaz, Professeur de Biologie de la Conservation, Université de Berne

fauna•vs dans la Vallée des Loups

L'assemblée générale de fauna•vs s'est tenue le 9 mai 2026 près d'Evolène, sous un ciel d'un bleu éclatant. Auparavant, les participants avaient pris part à une excursion sur les traces de la meute de loups d'Hérens-Mandelon, qui a élu domicile dans le Val d'Hérens.



Isabelle Germanier.

Une trentaine de participants, tous de bonne humeur, se sont retrouvés aux Haudères où ils ont été accueillis par Brigitte Wolf, présidente de fauna•vs. L'excursion a débuté sous la houlette d'Isabelle Germanier, membre du comité et étudiant depuis 2022 la meute d'Hérens-Mandelon dans le cadre du projet Mission Loup, et a longé la Borgne jusqu'à Evolène. En chemin, les participants ont pu se plonger dans l'univers d'Isegrim au fil de plusieurs étapes thématiques. Ils ont écouté avec intérêt les informations et les récits d'Isabelle Germa-nier, qui a d'abord présenté l'espèce, sa reproduction puis le fonctionnement d'une meute au fil de sa vie. Les étapes sui-vantes ont porté sur le comportement de chasse, la répartition territoriale, les zones tampon, le travail de fauna•vs sur les analyses génétiques des loups abattus ainsi que le thème de la protection des troupeaux et de la régulation. Il était fas-cinant d'apprendre que les loups sont très sociables, attachés à leur famille et que, par exemple, les jeunes loups sont au-torisés à effectuer des excursions dites «exploratoires», afin d'expérimenter la vie en solitaire sur le territoire de la meute. Ou qu'ils peuvent quitter la meute, parcourir des centaines de kilomètres et revenir, un certain nombre de fois. Les informa-tions sur les «lieux de rendez-vous» ont également suscité un vif intérêt: ces lieux se trouvent à l'extérieur de la tanière et servent de terrain de jeu aux louveteaux pendant que les adultes partent chasser.

À l'issue de l'excursion, l'assemblée générale s'est tenue en plein air. Outre les points statutaires à l'ordre du jour, Clémence Dirac-Ramohavelo (photo à droite) a fait ses adi-eux au comité. Clémence s'est engagée pendant de nom-breuses années au sein du comité de fauna•vs et a rédigé d'innombrables articles pour le bulletin. Sa grande expertise, ses connaissances approfondies ainsi que sa bonne humeur étaient très appréciées bien au-delà du comité. Nous remer-cions très chaleureusement Clémence pour son travail et son engagement en faveur de fauna•vs et de la faune sauvage, et nous nous réjouissons de pouvoir lire à l'avenir l'un ou l'autre article qu'elle écrira pour fauna•vs.

Lors de l'assemblée générale, 16 nouveaux membres ont par ailleurs été admis. fauna•vs enregistre depuis plusieurs années une augmentation constante du nombre de ses ad-hérents et comptait, fin 2025, un total de 259 membres. Il y a toutefois eu une triste nouvelle: Alain Vielle et Pierre Dubuis, membres de longue date de fauna•vs et défenseurs enga-gés de la nature, sont décédés en 2025. Les participants leur ont rendu hommage en observant une minute de silence. ■

Derzeit analysiert mein Team die unzähligen Daten, die seit 2011 im Wallis gesammelt wurden (im Schnitt 260'000 Aufnahmen pro Jahr). Unsere Ergebnisse werden zu Empfehlungen für ein nachhaltigeres Management der gesamten Grosswildfauna führen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob sich die Politik davon leiten lassen wird, da wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Biodiversität bei den politischen Entscheidungen leider noch allzu oft keine Rolle spielen. Die Beziehungen zwischen Raubtieren und Beutetieren sind komplexe Phänomene und schwer zu entschlüsseln. Wir bauen das notwendige Wissen Schritt für Schritt auf. Unsere Hoffnung ist, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse letztendlich in die von Beamten entwickelten Strategien und in die Entscheidungen der Politiker einfliessen werden.

Es gibt nach wie vor zu viele Äusserungen, die auf blossen Glaubenssätzen beruhen, und, schlimmer noch, auf einer von Populismus geprägten Politik. Langfristig ist dies eine Katastrophe für ein nachhaltiges Management unserer natürlichen Ressourcen. Schliesslich sei daran erinnert, dass Wissenschaft nicht nur die blosse Beobachtung der Welt ist – schliesslich kann sich jeder Laie erfreuen, die Natur zu beobachten. Wissenschaft ist auch und vor allem die Fähigkeit, das Beobachtete richtig zu interpretieren. Wir müssen aufhören, die Wildtiere so zu betrachten und zu verwalten, als wären wir blosse Beobachter... ■

Raphaël Arlettaz, Professor der Naturschutzbiologie (Conservation Biology), Universität Bern

fauna•vs im Tal der Wölfe

Die Generalversammlung von fauna•vs fand am 9. Mai 2026 unter einem strahlend blauen Himmel bei Evolène statt. Zuvor begaben sich die Teilnehmenden im Rahmen einer Exkursion auf die Spur des Wolfsrudels Hérens-Mandelon, das im Val d'Hérens zuhause ist.

Rund 30 gutgelaunte Teilnehmer:innen trafen sich in Les Haudères und wurden von der Präsidentin von fauna•vs, Brigitte Wolf, begrüsst. Die Exkursion startete unter der Leitung des Vorstandsmitglieds Isabelle Germanier, die sich seit 2022 im Rahmen des Projekts «Mission Loup» mit der Erforschung des Wolfsrudels von Hérens-Mandelon befasst, und führte entlang des Flusses Borgne nach Evolène. Unterwegs liessen sich die Teilnehmenden in mehreren Etappen in die Welt von Isegrim einführen. Gespannt hörten sie den Informationen und Erzählungen von Isabelle Germanier zu, die über das Leben des Wolfs und die Funktionsweise eines Rudels informierte. Sie erfuhren Interessantes über das Jagdverhalten der Wölfe, ihre Territorien, den Herdenschutz, die Bestandsregulierung und die Arbeit von fauna•vs (genetische Analysen der erlegten Wölfe). Faszinierend war die Erkenntnis, dass Wölfe sehr sozial und familiär sind und dass beispielsweise junge Wölfe sogenannte «Erkundungstouren» unternehmen dürfen, um das Leben als Einzelgänger im Revier des Rudels zu «üben», oder dass sie das Rudel verlassen, Hunderte von Kilometern zurücklegen und mehrmals ins Rudel zurückkehren können. Auch die Information über die sogenannten Rendez-vous-Plätze stiessen auf grosse Aufmerksamkeit: Diese Plätze befinden sich ausserhalb der Wohnhöhle und dienen den Welpen tagsüber zum Spielen, während die erwachsenen Tiere auf Jagd gehen.

Im Anschluss an die Exkursion fand die Generalversammlung unter freiem Himmel statt. Nebst den statutarischen Geschäften wurde Clémence Dirac-Ramohavelo (Foto) aus dem Vorstand verabschiedet. Clémence engagierte sich viele Jahre lang im Vorstand von fauna•vs und schrieb unzählige Artikel für das Bulletin. Ihre grosse Expertise und ihr umfassendes Wissen sowie ihre aufgestellte Art wurden weit über den Vorstand hinaus sehr geschätzt. Wir danken Clémence für ihre Arbeit und ihr Engagement für fauna•vs und die Wildtiere ganz herzlich und freuen uns auch in Zukunft über den einen oder anderen Artikel, den sie für fauna•vs schreiben wird.

Weiter wurden an der GV 16 neue Mitglieder aufgenommen. fauna•vs verzeichnet seit einigen Jahren ein kontinuierliches Mitgliederwachstum und zählte Ende 2025 total 259 Mitglieder. Es gab jedoch auch traurige Neuigkeiten: Alain Vielle und Pierre Dubuis, langjährige Mitglieder von fauna•vs und engagierte Naturschützer, verstarben 2025. Die Teilnehmenden gedachten in einer Schweigeminute an sie. ■



Clémence Dirac-Ramohavelo.

Régine Bernard, une bâtisseuse de liens au service du vivant (1960–2026)

La disparition de Régine Bernard laisse un grand vide dans le monde naturaliste valaisan. Hydrobiologiste reconnue, elle a consacré sa vie professionnelle à la connaissance et à la préservation des milieux aquatiques. Mais son engagement pour la nature dépassait largement le cadre de son activité professionnelle.

Pendant près de trente ans, Régine Bernard a marqué de son empreinte La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles. D'abord secrétaire, puis présidente dès 1999, elle a contribué à faire évoluer cette institution plus que centenaire en renforçant son ouverture et en diversifiant ses activités: conférences, excursions, camps pour les jeunes, publications ou encore projets de valorisation du patrimoine naturel valaisan.

Pour Régine, la protection de la nature reposait avant tout sur le partage des connaissances et le dialogue entre les acteurs engagés pour le vivant. Convaincue que les enjeux de biodiversité dépassent les frontières disciplinaires et institutionnelles, elle a œuvré au rapprochement des sociétés naturalistes valaisannes.

Les liens entre La Murithienne et faunaVS s'inscrivent dans une longue tradition de collaboration, mais Régine Bernard a largement contribué à les renforcer. Le colloque Biodiversité 2010, organisé conjointement par La Murithienne, faunaVS et le Musée de la nature du Valais, illustre parfaitement cette volonté de créer des ponts entre scientifiques, naturalistes amateurs, institutions et grand public. En assurant la modération des sessions consacrées à la biodiversité alpine et en participant à la réflexion sur le rôle des sociétés savantes dans la conservation, elle incarnait pleinement cette vision collaborative.

Cette dynamique s'est poursuivie au fil des années à travers l'organisation de conférences communes sur des thématiques variées: réseaux écologiques, chauves-souris, biodiversité urbaine ou encore protection des hirondelles et martinets. Pour Régine, ces collaborations constituaient bien plus qu'un simple partage logistique; elles représentaient une manière de construire une communauté naturaliste forte et solidaire au service de la biodiversité valaisanne.

Son engagement pour la transmission s'est également exprimé à travers le projet Nature-Culture & Tourisme. À la présidence de cette association, elle a coordonné le recensement de plus de 250 sentiers didactiques en Valais. Elle était convaincue que l'on protège mieux ce que l'on connaît et que la découverte des richesses naturelles et culturelles permet de susciter l'émerveillement, le respect et l'envie de préserver.



Nombreux sont celles et ceux qui témoignent aujourd'hui de sa générosité dans le partage des connaissances, de sa rigueur scientifique, de son enthousiasme communicatif et de sa capacité à encourager les autres. Plusieurs générations de biologistes et de naturalistes ont trouvé auprès d'elle une écoute attentive, des conseils avisés et un modèle d'engagement.

Régine Bernard laisse derrière elle bien plus que des études, des rapports ou des projets associatifs. Elle laisse une communauté naturaliste valaisanne renforcée par les liens qu'elle a su tisser entre les personnes, les disciplines et les institutions.

À travers son action au sein de La Murithienne et ses collaborations avec faunaVS, elle nous rappelle que la protection de la nature est avant tout une aventure collective, fondée sur la curiosité, le partage et l'engagement au service du vivant. ■

Romaine Perraudin

Régine Bernard – die Brückenbauerin im Dienste der Natur (1960–2026)

Der Tod von Régine Bernard hinterlässt eine grosse Lücke in der Walliser Naturforscherszene. Als anerkannte Hydrobiologin widmete sie ihr Berufsleben der Erforschung und dem Schutz aquatischer Lebensräume. Doch ihr Engagement für die Natur ging weit über den Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit hinaus.

Fast dreissig Jahre lang prägte Régine Bernard die «La Murithienne», die Walliser Gesellschaft für Naturwissenschaften. Zunächst als Sekretärin, ab 1999 dann als Präsidentin trug sie dazu bei, diese mehr als hundertjährige Institution weiterzuentwickeln, indem sie ihre Offenheit förderte und ihre Aktivitäten diversifizierte: Die «Murthienne» organisiert heute Vorträge, Exkursionen, Jugendlager, Publikationen oder auch Projekte zur Aufwertung des Walliser Naturerbes.

Für Régine Bernard beruhte der Naturschutz vor allem auf dem Austausch von Wissen und dem Dialog zwischen den Akteuren, die sich für die Lebewesen engagierten. In der Überzeugung, dass die Herausforderungen der Biodiversität über disziplinäre und institutionelle Grenzen hinausgehen, setzte sie sich für die vermehrte Zusammenarbeit der Walliser Naturforschergesellschaften ein.

Die Verbindung zwischen La Murithienne und faunaVS hat eine lange Tradition der Zusammenarbeit, doch Régine Bernard hat massgeblich dazu beigetragen, diese zu stärken. Das Kolloquium «Biodiversität 2010», das gemeinsam von La Murithienne, faunaVS und dem Walliser Naturmuseum organisiert wurde, veranschaulicht perfekt diesen Willen, Brücken zwischen Wissenschaftlern, Amateur-Naturforschern, Institutionen und der breiten Öffentlichkeit zu schlagen. Régine Bernard verkörperte diese Vision der Zusammenarbeit auch, indem sie die Moderation der Treffen zur alpinen Biodiversität übernahm und sich an den Überlegungen zur Rolle der wissenschaftlichen Gesellschaften im Naturschutz beteiligte.

Die Zusammenarbeit mit faunaVS setzte sich im Laufe der Jahre in der Organisation gemeinsamer Konferenzen zu verschiedenen Themen fort: ökologische Netzwerke, Fledermäuse, städtische Biodiversität oder auch der Schutz von Schwalben und Mauerseglern. Für Régine Bernard waren diese Kooperationen weit mehr als nur ein logistischer Austausch; sie stellten eine Möglichkeit dar, eine starke und solidarische Naturforschergemeinschaft im Dienste der Walliser Biodiversität aufzubauen.

Ihr Engagement für die Wissensvermittlung kam auch im Projekt «Natur-Kultur & Tourismus» zum Ausdruck. Als Vorsitzende dieses Vereins koordinierte sie die Erfassung von mehr als 250 Lehrpfaden im Wallis. Sie war davon überzeugt, dass man das, was man kennt, besser schützt, und dass die Entdeckung der natürlichen und kulturellen Reichtümer Staunen, Respekt und den Wunsch nach Erhaltung weckt.

Zahlreiche Menschen durften ihre Grosszügigkeit beim Teilen ihres Wissens erleben, ihre wissenschaftliche Genauigkeit, ihre ansteckende Begeisterung und ihrer Fähigkeit, andere zu ermutigen. Mehrere Generationen von Biolog:innen und Naturforscher:innen fanden bei ihr ein offenes Ohr, kluge Ratschläge und ein Vorbild an Engagement.

Régine Bernard hinterlässt weit mehr als Studien, Berichte oder Vereinsprojekte. Sie hinterlässt eine Gemeinschaft der Walliser Naturforscher:innen, die sie selbst gestärkt hat – durch Verbindungen, die sie zwischen Menschen, Disziplinen und Institutionen geknüpft hat. Durch ihr Engagement bei «La Murithienne» und ihre Zusammenarbeit mit faunaVS erinnert sie uns daran, dass Naturschutz in erster Linie ein gemeinschaftliches Abenteuer ist, das auf Neugier, Austausch und Engagement im Dienste des Lebendigen beruht. ■

Romaine Perraudin

Vorankündigung: Atlas der Flora des Wallis


Nach zehnjähriger Erhebungsarbeit freut sich der Verein FloraVS, mitteilen zu können, dass der Atlas der Walliser Flora bis Ende 2026 erscheinen wird. Rund hundert Arten werden in Form von Steckbriefen vorgestellt. Für weitere 2550 Arten gibt es eine Verbreitungskarte. In über fünfzig Kästen werden verschiedene Themen behandelt. Der Atlas kann bis am 15. August zum Vorzugspreis vorbestellt werden unter **www.floravs.ch.**

Annonce préalable: Atlas de la flore du Valais

Après de 10 ans de travail de recensement, l'association FloraVS a le plaisir de vous annoncer la parution de l'Atlas de la flore du Valais d'ici la fin de l'année 2026. Une centaine d'espèces sont illustrées sous forme de fiches. 2550 autres font l'objet d'une carte de répartition. Plus de cinquante encadrés développent diverses thématiques. L'atlas peut être précommandé à un prix préférentiel jusqu'au 15 août sur **www.floravs.ch.**

Alain Vielle (1933-2025)

Le 2 décembre 2025, Alain Vielle est décédé à l'âge de 92 ans. Il a été pendant de nombreuses années membre de faunaVS et lauréat du «Prix faunaVS» en 2012 pour couronner son travail de prospection, d'étude et de sauvetage des écrevisses indigènes pour lesquelles Alain Vielle se passionnait.



Cet ancien dentiste a consacré d'innombrables heures à la défense de ce groupe d'animaux plutôt méconnu. Grâce à son engagement, il a grandement contribué à l'amélioration des connaissances sur l'état et la répartition des écrevisses en Valais. Il s'est battu sans relâche pour la protection de ces animaux aquatiques discrets, que nous remarquons à peine, et a milité pour qu'on leur accorde davantage d'attention !

Nous nous souvenons encore très bien de l'excursion organisée par faunaVS en avril 2012 dans la forêt de Finges. Sous le titre « Le bois de Finges, ses étangs et ses écrevisses », Alain a fait découvrir aux participants la vie de ces crustacés indigènes. Ce fut l'une des excursions les plus fréquentées de faunaVS!

Nous remercions profondément Alain Vielle pour son immense travail mené pendant de nombreuses années au service de l'étude et de la protection des écrevisses! ■

Alain Vielle (1933-2025)

Am 2. Dezember 2025 ist Alain Vielle im Alter von 92 Jahren gestorben. Alain war während vielen Jahren Mitglied von faunaVS und im Jahr 2012 Preisträger des «Prix faunaVS», als Anerkennung für sein Engagment zur Erforschung und Rettung der einheimischen Flusskrebse, für die er eine grosse Leidenschaft entwickelt hatte.



Der ehemalige Zahnarzt hat sich in unzähligen Stunden für diese eher unbekannte Tiergruppe eingesetzt. Mit seinem Engagement hat er viel zum Wissen über den Zustand und die Verbreitung der Krebse im Wallis beigetragen. Er setzte sich unermüdlich für den Schutz dieser unscheinbaren, von uns kaum wahrgenommenen Wassertiere ein und warb dafür, dass den Krebsen mehr Beachtung geschenkt wird!

Noch gut können wir uns an die Exkursion von faunaVS im April 2012 im Pfynwald erinnern. Unter dem Titel «Der Pfynwald, seine Teiche und seine Krebse» brachte Alain Vielle den Teilnehmenden das Leben der Krebse näher. Es war eine der bestbesuchten Exkursionen von faunaVS!

Wir danken Alain Vielle ganz herzlich für seine grosse Arbeit während vielen Jahren im Zeichen der Erforschung und des Schutzes der einheimischen Flussrebse! ■

Vielen Dank für Ihre Spende!

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Arbeit von faunaVS wie beispielsweise die Herausgabe unseres Bulletins faunaVS info, Beratung bei Anfragen zu Wildtieren oder die Organisation und Durchführung von Exkursionen und Konferenzen.

Merci beaucoup pour votre don!

Grâce à votre don, vous soutenez le travail de faunaVS, notamment la publication de notre bulletin faunaVS info, les conseils sur les questions relatives aux animaux sauvages ou l'organisation et la réalisation d'excursions et de conférences.

Abattage intempestif d'un loup le 3 mai à Visperterminen: fauna•vs s'insurge

Unangemessener Abschuss eines Wolfes am 3. Mai in Visperterminen: fauna•vs protestiert

Le 24 avril 2026, M. Christophe Darbellay, Président du Gouvernement valaisan, a ordonné le tir d'un loup dans la région de Visperterminen-Obserstalden. Dans la foulée, un loup mâle y a été abattu le 3 mai. S'il n'a génétiquement pas pu être formellement rattaché à la meute de Nanz à ce stade, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas du mâle reproducteur. fauna•vs a envoyé un courrier de contestation au Conseil d'Etat valaisan, décriant une décision intempestive, arbitraire et injustifiée car les conditions n'étaient pas remplies: ni en matière de protection des troupeaux ni en ce qui concerne un tir dit réactif. Nous publions ici ce courrier.

Am 24. April 2026 ordnete Christophe Darbellay, Präsident der Walliser Regierung, den Abschuss eines Wolfes in der Region Visperterminen-Obserstalden an. In der Folge wurde dort am 3. Mai ein männlicher Wolf erlegt. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt genetisch noch nicht eindeutig dem Rudel von Nanz zugeordnet werden konnte, steht fest, dass es sich nicht um das fortpflanzungsfähige Männchen handelt. fauna•vs hat dem Staatsrat einen Brief gesendet, in dem die voreilige, willkürliche und ungerechtfertigte Entscheidung beanstandet wird, da die Voraussetzungen weder im Hinblick auf den Herdenschutz noch auf einen reaktiven Abschuss erfüllt waren. Wir veröffentlichen dieses Schreiben hier (auf Französisch).

Recommandée, Brig le 19 mai 2026

Contestation de la décision du Département de l'économie et de la formation d'abattre un loup dans le Bas-Vispertal dans le cadre de la régulation dite réactive

Par la présente, Fauna.vs, Société Valaisanne de Biologie de la Faune, entend contester la récente décision de tirer un loup dans la région du Bas-Vispertal (Vispterminen-Oberstalden). Prise le 24 avril 2026 par M. Christophe Darbellay, Conseiller d'Etat, Président du Gouvernement valaisan et chef du Département de l'économie et de la formation (DEF), cette décision ne respecte pas les prescriptions légales en vigueur. Il s'agit par ailleurs de «récidive», un cas similaire ayant déjà été jugé par le Tribunal cantonal valaisan en 2020 (annexe 1), qui a donné tort à l'Etat du Valais et raison aux opposants d'alors (Office Fédéral de l'Environnement, WWF et Pro Natura). Les circonstances sont en effet analogues, démontrant à nouveau des dysfonctionnements de même type dans l'établissement des dossiers. Dans ce contexte, on eut pu s'attendre à ce que le jugement de 2020, qui devrait pourtant servir de leçon et faire office de jurisprudence, eut servi d'exemple.

Les arguments mis ici en avant par Fauna.vs – certains sont nouveaux par rapport à ceux avancés par l'OFEV dans son récent recours – reposent sur une étude approfondie du dossier remis aux autorités fédérales par le DEF, sur les informations disponibles sur différentes plateformes internet publiques, dont celles du KORA et du Service chasse et pêche valaisan (SCPF), ainsi que sur les constatations faites lors d'une visite sur place par Fauna.vs elle-même en date du 8 mai 2026.

1. La régulation réactive ne pouvait être déclenchée

- La meute dite de Nanz (Visperterminen et Oberstalden se trouvent au cœur de son domaine vital) s'est reproduite en 2023, 2024 et 2025. Il était donc abusif de considérer la présence de loups dans ce secteur comme concernant un ou des loups solitaires, comme en fait état le jugement du Tribunal cantonal de 2020 pour le cas d'un loup abattu illégalement dans la région Anniviers-Réchy, également sur décision étatique.

- Le rapport officiel du KORA du 3 février 2026 (extraits ci-dessous), qui était pourtant joint au dossier de prise de décision du DEF, indique que la meute de Nanz s'est reproduite en 2025, avec au moins un louveteau. Le KORA ne faisant pas lui-même de monitoring du loup – charge qui en Suisse incombe aux cantons – mais se contentant d'en tenir un registre, cette information ne peut provenir que des rapports que l'Etat du Valais élabore. Il s'agit donc ici d'une contradiction problématique entre les éléments factuels du dossier déposé par l'autorité valaisanne et le libellé justificatif de sa propre décision. La décision du DEF outrepasse donc cette information factuelle clef, issue de ses propres activités de suivi; ses responsables en avaient pleinement connaissance, mais ont prétendu, contre toute évidence, que la meute de Nanz ne s'est pas reproduite en 2025. Par ailleurs, les responsables du DEF étaient tenus, en vertu de la loi, d'amener la preuve d'une absence de reproduction en 2025, ce qu'ils n'ont pas pu établir, et pour cause.

KORA

Reproductions, tirs (conformément aux art. 7a et 12 de la LCN) **et autorisations de tirs de loups communiqués par les cantons – année du monitoring 2025** (01.02.2025-31.01.2026)

(Situation au 03.02.2026, 12:00)

Autorisations de tir et tirs effectués

Catégories : Loup isolé selon l'art. 9b de l'OCNF, loup d'une meute selon l'art. 9c de l'OCNF, régulation réactive selon l'art. 4c de l'OCNF, régulation proactive (régulation partielle ou prélèvement d'une meute) selon l'art. 4b de l'OCNF


Canton	Date	Catégorie	Autorisations de tirs	Statut	Tirs
BE	09.07.2025	Loup isolé	Autorisation de tir d'un loup isolé dans la région Guttannen en raison d'attaques sur des animaux de rente, valable 45 jours	Délai expiré	
GL	24.01.2025 /20.02.2025	Loup isolé	Autorisation de tir de deux loups isolés dans la région d'Elm en raison d'un comportement indésirable envers les humains, valable 30 jours/ Prolongation de l'autorisation de 30 jours supplémentaires	Délai expiré	- 04.02.2025 : 1 loup
GR	28.05.2025	Loup isolé	Autorisation de tir d'un loup isolé dans la région Lantsch en raison d'un comportement indésirable envers les humains, valable 60 jours	Délai expiré	
GR	24.06.2025	Loup isolé	Tir d'un loup isolé à Pontresina en raison d'un comportement indésirable.	Tir effectué	- 24.06.2025 : 1 loup

Reproductions confirmées

Canton	Meute	Première détection des louveteaux	Reproductions observées
VD	Mont Tendre	Juin	Au moins 4 louveteaux confirmés
GL/SG	Schilt 2	Juillet	Au moins 4 louveteaux confirmés
GL/SZ	Chöpfenberg	Juillet	Au moins 5 louveteaux confirmés, confirmant ainsi la présence d'une nouvelle meute
GR	Älpetli	Juillet	Au moins 7 louveteaux confirmés
GR	Muchetta	Juillet	Au moins 5 louveteaux confirmés
VS	Nanz	Août	Au moins 1 louveteaux confirmés
VS	Les Toules	Août	Au moins 2 louveteaux confirmés
VS	Binntal	Août	Au moins 4 louveteaux confirmés, confirmant ainsi la présence d'une nouvelle meute
GL	Kaerpf	Septembre	Au moins 3 louveteaux confirmés
GR	Moesola	Septembre	Au moins 5 louveteaux confirmés
GR	Sinestra	Septembre	Au moins 7 louveteaux confirmés, confirmant ainsi la présence d'une nouvelle meute
TI	Lepontino	Septembre	Au moins 5 louveteaux confirmés
VS	Salentin	Septembre	Au moins 2 louveteaux confirmés
NE/VD	Jougne/Suchet	Octobre	Au moins 6 louveteaux confirmés
TI	Gridone	Octobre	Au moins 4 louveteaux confirmés
TI	Onsernone	Octobre	Au moins 6 louveteaux confirmés
TI	Aspra	Octobre	Au moins 4 louveteaux confirmés, confirmant ainsi la présence d'une nouvelle meute
VD	Marchairuz	Octobre	Au moins 1 louveteau confirmé
GR	Frisal	Décembre	Au moins 2 louveteaux confirmés, confirmant ainsi la présence d'une nouvelle meute
OW	Klein-Melchtal	Décembre	Au moins 1 louveteau confirmé, , confirmant ainsi la présence d'une nouvelle meute

- Le nouveau couple reproducteur de la meute de Nanz, actuellement constitué de M555 & F150, est génétiquement attesté sur ce territoire depuis début 2025 (antérieurement, les mâles reproducteurs étaient M265 et M365). M555 et F150 ont par ailleurs encore été identifiés génétiquement sur ce territoire les 8 et 9 février 2026. Il s'agit donc des mêmes reproducteurs de la même meute au sein du même territoire, et non de la présence d'un ou de deux loups solitaires. Prétendre que le secteur de Visperterminen-Obstalden, situé au coeur du domaine vital de la meute de Nanz, et où ont eu lieu les récentes déprédations incriminées, était habité par un ou deux loups solitaires relève de la manipulation. On notera également que le document «Informationen zur Wolfsregulierung», qui doit impérativement accompagner le dossier élaboré par le canton à destination de la Confédération, est totalement vide ! Devraient y figurer, notamment, des indications sur la génétique des loups présents dans ce secteur (meute de Nanz) et les effectifs régionaux de loups.

- Le périmètre géographique qui a été défini pour effectuer ce tir réactif est vaste, couvrant environ un tiers du domaine vital de la meute de Nanz. Délimiter une zone aussi étendue pour un tir réactif est contraire aux exigences légales (LChP et OChP) qui stipulent qu'un tel tir soit effectué non loin des déprédations afin d'obtenir l'effet éducatif voulu par le législateur. Les deux sites de déprédations incriminés n'étaient distants que de 450 m. Une zone de quelques kilomètres carrés aurait convenu. Or, le périmètre retenu couvre 50 km^2, ce qui est abusif et va à l'encontre de l'effet recherché: punir un loup effectivement responsable de dommages et éviter de tirer un loup qui n'aurait rien à se reprocher.



- Notons par ailleurs, et subsidiairement, que le seuil de déprédations pour qu'une meute soit soumise à la régulation proactive est de huit têtes de petit bétail, tandis qu'une telle régulation proactive nécessite l'aval de l'OFEV et ne peut être opérée au plus tôt que dès le 1er septembre. Enfin, une régulation réactive, dans les conditions affichées, ne peut de toute façon pas être mise en place avant le 1er juin, pour des questions éthiques, les loups étant en pleine phase de reproduction. Aucune de ces conditions n'aurait de toute façon été remplie (sept victimes, soit une de moins que requis pour une régulation proactive) ou respectée (aucune opération avant le 1er juin n'est possible pour la régulation réactive) dans le cas qui nous concerne. Par ailleurs, au moins trois des sept déprédations déclarées émanaient d'un pâturage qui n'était pas protégé selon les normes en vigueur (cf. infra).

2. La protection des animaux de rente n'était pas conforme aux prescriptions

- Au moins un des deux troupeaux, celui de Leeji (dossier 72178), n'était pas protégé selon les normes en vigueur, ce qui est attesté par une photographie figurant dans le dossier même de demande en régulation du canton du Valais (!): le portail d'entrée n'avait de toute évidence pas été correctement électrifié: il lui manquait une, voire plusieurs bandes électrifiées sommitales, comme l'exige une mise en oeuvre correcte des mesures de protection des troupeaux. Il était aisé pour un loup, dans ces circonstances, de franchir ce portail: il a même pu y prendre appui dans son élan pour pénétrer dans le périmètre du parc. Les trois chèvres prédatées sur ce pâturage ne devaient donc pas être comptabilisées comme victimes de déprédations puisque paissant sur un pâturage protégeable mais qu'on doit de facto considérer comme ayant été non correctement protégé. Des sept déclarées, le nombre de victimes passe donc à quatre, ce qui est au-dessous du seuil défini pour la régulation d'un loup solitaire (six). Le cliché ci-dessous à gauche est tiré du rapport de Horacio Beltran, préposé haut-valaisan à la protection des troupeaux, qui affirme dans son rapport que le pâturage était protégé alors qu'il ne l'était pas. Celle de droite, prise le 8 mai 2026 par Fauna.vs quelques centaines de mètres au-dessus du site en question, montre comment le portique d'un pâturage devrait être électrifié pour que l'enclos assure une protection correcte du bétail.





- Subsidiairement, la méthode d'électrification du parc de Leeji n'était pas correcte. Lors de la visite du 8 mai, l'alimentation électrique photovoltaïque était, étonnamment, toujours active malgré l'absence de bétail dans le parc. Or, la mise à terre n'était pas connectée à une barre métallique profondément enfoncée dans le sol (souvent on utilise à cet effet le support de l'unité de production photovoltaïque). Par ailleurs, aucune telle barre n'était visible dans les environs du module d'électrification, à distance accessible du câble de la prise de mise à terre, tandis que le module photovoltaïque était posé à même le sol. En outre, la mise à terre était connectée au câble inférieur du flexinet, ce qui signifie que le système aurait pu ne pas avoir été mis correctement sous tension lors des déprédations.



- Une pénétration dans ce parc par un loup aurait été d'autant plus aisée en de telles circonstances, tant par le portail que sur tout le pourtour, ce qui pourrait expliquer que le flexinet était courbé en deux endroits le 8 mai, peut-être suite à l'entrée du ou des prédateurs. Dès lors, on peut se demander si l'installation électrique elle-même, outre le portail non électrifié, était déjà bancale lors des attaques?






- Aucune clôture électrifiée n'était (plus?) présente le 8 mai sur le pâturage 72184 (situé entre Niederhäusern et Ze Stüdü), second lieu des déprédations (quatre moutons). Aucune trace de pâture ou de crottes n'était visible sur cette surface. Seule était en place une ancienne clôture métallique aisément franchissable par un loup car pliée au sol en plusieurs points; celle-ci n'aurait donc su compter comme une mesure de protection raisonnable et suffisante. Il est toutefois impossible de reconstituer a posteriori de façon certaine l'installation qui protégeait ici le troupeau, dans l'éventualité où elle aurait été rapidement retirée après les attaques.

Sur la base de ces éléments factuels – émanant en grande partie des rapports mêmes établis par les agents de l'Etat, il est important de le souligner – il apparaît clairement que la décision du DEF de déclencher la régulation réactive d'un loup suite à des déprédations sur des petits animaux de rente dans la région de Visperterminen-Oberstalden était abusive, en violation totale de la législation en vigueur (LChP et OChP). D'une part, la région est habitée par une meute à reproduction régulière et non par des loups solitaires. D'autre part, l'un des deux pâturages où ont eu lieu les déprédations incriminées ne disposait pas d'un enclos électrique installé conformément aux normes en vigueur.

Entretemps, un loup mâle adulte a été abattu dans cette région alors qu'il n'aurait pas dû l'être, ceci en raison de l'incurie de nos services publics cantonaux. Les analyses génétiques montreront si c'est le géniteur de la meute de Nanz qui a été abattu.

Les fautes commises dans l'élaboration du dossier par les agents de l'Etat ainsi que la décision intempestive d'autoriser une régulation réactive par le Président du Gouvernement valaisan dénotent à nouveau – de manière similaire à ce qu'avait déjà pointé du doigt le jugement du Tribunal cantonal de 2020 – des dysfonctionnements au niveau de l'administration cantonale. Et ce nouveau cas n'est pas isolé: plusieurs rapports de régulation de meutes envoyés par le Canton du Valais à l'Office fédéral de l'environnement ces dernières années étaient de manière similaire criblés de fautes graves d'interprétation des données. Ces erreurs n'ont pas pu échapper aux autorités de surveillance que sont le KORA et l'OFEV, mais nous n'avons jamais entendu ces instances s'exprimer sur ce point.

Dans l'attente de votre retour, recevez, Madame, Messieurs les Conseillers d'Etat, nos meilleurs messages.



Brigitte Wolf
Présidente de fauna.vs



Isabelle Germanier
Membre du comité



Raphaël Arlettaz
Membre du comité

Annexes:
- Jugement du Tribunal cantonal de 2020, qui devrait faire office de jurisprudence en la matière

Copie pour information:
- M. Urs Wegmann, OFEV, Berne

Réseau Chauves-souris Valais

Les spécialistes du Réseau Chauves-souris Valais se tiennent à votre diposition:



Réseau chauves-souris Valais
Anouk Lettman, tél 079 589 74 11
info@chauve-souris-valais.ch
www.chauve-souris-valais.ch

Verein Walliser Fledermausschutz

Bei Fragen zu den Fledermäusen hilft Ihnen der Verein Walliser Fledermausschutz gerne weiter:



Verein Walliser Fledermausschutz
Silvan Stöckli, Tel. 079 910 74 11
info@fledermaus-wallis.ch
www.chauve-souris-valais.ch/de

Réseau Gypaète Suisse occidentale

Signalement des observations et renseignements auprès de la coordinatrice:



Réseau Gypaète Suisse occidentale
Célestin Luisier, celestin.luisier@gypaetebarbu.ch
tél 078 864 68 76, www.gypaetebarbu.ch

Bartgeier-Netzwerk Westschweiz

Das Bartgeier-Netzwerk Westschweiz ist unter folgender Adresse erreichbar:

Bartgeiernetzwerk Westschweiz
Célestin Luisier, celestin.luisier@gypaetebarbu.ch
Tel. 078 864 68 76, www.bartgeier.ch

Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse





Les responsables pour leValais romand:

- *Flavio Zanini (amphibiens): 078 854 42 11, flavio.zanini@drosera-vs.ch*
- *Florian Dessimoz (reptiles Valais central): 079 475 23 01, florian.dessimoz@drosera-vs.ch*
- *Julien Rombaldoni (reptiles Bas-Valais): 078 684 72 27, julien@rombaldoni.ch*

Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz

Die Verantworlichen für das Oberwallis:

- *Ivana Cervenka (Goms, Östlich Raron und Brig): 077 438 48 11, ivana.cervenka@ecospecta.ch,*
- *Silvan Stöckli (Visp, Westlich Raron und Leuk): 076 321 50 80, info@umwelt-werk.ch*

Impressum

fauna•vs **info** est le bulletin d'information de la Société valaisanne de biologie de la faune. Il sert aussi de feuille de liaison au Réseau Gypaète Suisse occidentale, au Réseau Chauves-souris Valais et au KARCH Valais.

Responsable / **verantwortlich**:
Comité de / Vorstand von fauna•vs
Furkastrasse 29, 3900 Brig,
079 353 01 19
info@fauna-vs.ch
www.fauna-vs.ch

Parution / **Erscheinungsweise**:
deux fois par an / zweimal jährlich.

Maquette / **Layout**: Brigitte Wolf

Impression / **Druck**: Aebi Druck, Susten

Tirage / **Auflage**: 380 ex. / Stück.

Impressum

Das fauna•vs **info** ist das Mitteilungsblatt der Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie. Es dient auch dem Bartgeier-Netzwerk Westschweiz, dem Verein Walliser Fledermausschutz und der KARCH Wallis als Mitteilungsblatt.

Dons / Spenden

Je désirerais faire partie de fauna•vs
Ich möchte Mitglied von fauna•vs werden

❑ comme membre ordinaire / als Mitglied (CHF 60.– par an / pro Jahr)
❑ comme membre de soutien / als Gönner/in (CHF 100.– par an / pro Jahr)
❑ comme membre collectif / als Kollektivmitglied (CHF 60.– par an / pro Jahr)
❑ je suis étudiant, je gagne peu ou j'ai moins de 25 ans (50% du prix)
Ich bin Student, wenigverdienend oder unter 25 Jahre (50% des Preises)

Nom et prénom /
Name und Vorname: _____

Adresse, NPA et Lieu /
Adresse, PLZ und Ort: _____

Téléphone /
Telefon-Nr.: _____

E-mail /
E-Mail: _____

Institution /
Institution: _____

Signature /
Unterschrift: _____

Remarque /
Bemerkung: _____